

## SINTESIS DE ESTUDIOS ENCONTRADOS

Numero	Autor/año	Título	Base de Datos	Publicación	Palabras clave	Propósito	Diseño	Resultados
1	Stansfeld SA, Shipley MJ, Head J, Fuhrer R, Kivimaki M.	Work Characteristics and Personal Social Support as Determinants of Subjective Well-Being.	Proquest	United States. PLoS One. Noviembre del 2013	Social support, Quality of life, Stress, Aging, Occupational stress	El bienestar es un resultado de salud importante y un potencial indicador nacional del éxito de una política de salud. Este estudio examina el papel del apoyo social al personal y ambiente de trabajo psicosocial como predictor del bienestar en los trabajadores.	Cuantitativo Longitudinal	Los resultados sugieren que el entorno psicosocial de trabajo y las relaciones personales tienen efectos independientes sobre el bienestar subjetivo. Las políticas destinadas a aumentar el bienestar nacional deben tener en cuenta la calidad de las condiciones de trabajo y los factores que facilitan las relaciones personales positivas. Las políticas destinadas a mejorar los lugares de trabajo deben centrarse no sólo en minimizar los aspectos negativos del trabajo, sino también en el aumento de los aspectos positivos del trabajo
2	Hill E, Billington R y Krägeloh R	Noise sensitivity and diminished health: Testing moderators and mediators of the relationship	Proquest	Department of Psychology, Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand. Noise & Health, January-February 2014, Volume 16:68, 47-56	Health complaints, noise sensitivity, stress	La sensibilidad al ruido parece ser un factor de riesgo para la salud que influye en el desarrollo de problemas de salud mental y física. sin embargo, no se conocen los mecanismos para que no se presente sensibilidad al ruido. El presente estudio examina si una serie de variables actúan como mediadores y moderadores en la relación entre la sensibilidad al ruido y los problemas de salud. Fueron 1102 residentes en Auckland, Nueva Zelanda quienes llenaron una encuesta.	Cuantitativo descriptivo Correlacional	Como era de esperar, una mayor sensibilidad al ruido se asoció con problemas de salud. En concreto, es posible que las personas sensibles al ruido sean más propensas a experimentar estrés psicológico, el cual, los coloca en riesgo de desarrollar problemas de salud.

3	Republica de Colombia. Ministerio de Protección Social	Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Desórdenes Musculoesqueléticos (DME) relacionados con Movimientos Repetitivos de Miembros Superiores (Síndrome de Túnel Carpiano, Epicondilitis y Enfermedad de De Quervain (GATI- DME)	Google Academic	Bogotá, Diciembre de 2006	Ninguna	Emitir recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo integral (promoción, prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación) del STC, enfermedad de De Quervain y Epicondilitis relacionada con movimientos repetitivos y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo.	Guía Basada en la Evidencia	Para el control de los factores de riesgo para los DME, se recomienda diseñar y/o rediseñar los sistemas de trabajo, buscando la óptima adaptación entre las capacidades humanas y las exigencias del puesto de trabajo. Los principales aspectos a tener en cuenta en el diseño de los sistemas de trabajo son: <ul style="list-style-type: none"> <li>• organización del trabajo (sistemas de producción, métodos operativos, tiempos establecidos entre otros)</li> <li>• Interacción con herramientas, máquinas y tecnología.</li> <li>• Requerimientos físicos de la actividad de trabajo (postura, movimiento, fuerza, repetitividad, tipo de trabajo estático y/o dinámico)</li> <li>• Interacción del hombre con el sistema de trabajo y el entorno (dimensiones del puesto, espacios de trabajo, características de los materiales en cuanto a la superficie de trabajo)</li> <li>• Control de la vibración segmentaria</li> </ul>
4	Foss L, Gravseth H, Kristensen P, Claussen B, Mehlum I, Knardahl S y Skyberg K.	The Impact of Workplace Risk Factors on Long-term Musculoskeletal Sickness Absence: A Registry-Based 5-Year Follow-Up From the Oslo Health Study	Ovid	JOEM. Volume 53, Number 12, December 2011	Sickness absence, Musculoskeletal Sickness	Determinar la influencia de los factores de riesgo relacionados con el trabajo por género en la ausencia a largo plazo con diagnósticos de enfermedad musculoesquelética.	Cuantitativo Longitudinal	En asociación con la variable de exposición laboral, fue más fuerte para los hombres. Aún así, el riesgo de ausencia a largo plazo con diagnósticos de enfermedad musculoesquelética fue considerablemente mayor en las mujeres.
5	Abdel-Hamid M, Hakim S, Elokda E y Mostafa N	Prevalence and risk factors of sick building syndrome among office workers	Proquest	Journal of the Egyptian Public Health Association. 28 de Mayo 2013	Job satisfaction, office workers, psychosocial working conditions, sick building syndrome, work office environment	El síndrome del edificio enfermo (SBS) es un grupo de síntomas relativamente frecuentes entre los trabajadores de oficina; Estos síntomas pueden tener un impacto en la productividad de los trabajadores. El objetivo de este estudio es medir la prevalencia de síntomas de SBS entre los trabajadores de oficina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Ain Shams, El Cairo, Egipto y para determinar los posibles factores de riesgo.	Cuantitativo descriptivo Transversal	SBS fue altamente prevalente entre los trabajadores de oficina y fue influenciado por las condiciones de trabajo físicas y psicosociales. Una buena ventilación, reducción de la temperatura ambiente, las rutinas de limpieza eficaces, proporcionar iluminación adecuada, restricción de fumar en el lugar de trabajo y mejorar las condiciones de trabajo psicosociales son formas importantes de reducir los síntomas de SBS.
6	Nathan B. Fethke, Merlino L y Gerr F	Effect of Ergonomics Training on Agreement Between Expert and Nonexpert Ratings of the Potential for Musculoskeletal Harm in Manufacturing Tasks	Ovid	JOEM. Volume 55, Number 12 Supplement, December 2013	Musculoskeletal Harm, Ergonomics Training	Evaluar el efecto del entrenamiento de la ergonomía con las habilidades ergonómicas para reconocer y caracterizar el potencial de daño musculoesquelético en tareas de fabricación.	Cuantitativo Longitudinal	Los valores mejoraron en general después del entrenamiento. Se observó mejoría para el personal subalterno con posibilidad de daños musculoesqueléticos cuello y/o hombro

7	Croghan G & Johnson C	Occupational health and school health: a natural alliance?	PubMed	2004 Blackwell Publishing Ltd, Journal of Advanced Nursing, 45(2), 155-161	School nursing, occupational health nursing, collaboration	La salud escolar y la salud en el trabajo tienen objetivos similares y trabajando juntos, pueden ser capaces de mejorar la salud de las algunas poblaciones. Este publicación tiene por objeto analizar las similitudes en los principios y prácticas entre la salud escolar y la salud ocupacional, para identificar las áreas de superposición en el que la colaboración podría mejorar la atención de ambos servicios.	Revisión de Literatura	Se llegó a la conclusión de que sí existe una alianza natural entre enfermería del trabajo y la enfermería escolar. Los dos deben trabajar juntos para asegurar la continuidad de cliente, y para preparar a los niños y jóvenes para el lugar de trabajo y las cuestiones particulares de salud en las carreras elegidas. Aunque el servicio de salud escolar no proporciona los servicios de salud para el personal de la escuela, se ha sugerido que el uso de las habilidades del personal de salud escolar en la protección y promoción de la salud del personal de la escuela es un paso necesario en el mantenimiento de una escuela saludable
8	Bodin, Julie, Le Manac'h, Audrey Petit, et al.	Risk factors for incidence of rotator cuff syndrome in a large working population	Proquest	Scandinavian Journal of Work, Environment & Health; Sep 2012; 38, 5, pg. 436	Musculoskeletal disease, MSD, occupational factor, personal risk factor RCS, shoulder, tendinitis, work.	El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de los factores personales y relacionadas con el trabajo sobre la incidencia del síndrome del manguito rotador (RCS) en una población de trabajo grande.	Cuantitativo descriptivo Transversal	Un total de 839 hombres y 617 mujeres sin RCS al inicio del estudio fueron elegibles para el análisis. Fue diagnosticado RCS en 51 hombres (6,1%) y 45 mujeres (7,3%). La edad fue el predictor más fuerte de los casos incidentes de RCS y la abducción de brazo fue el principal factor de riesgo relacionado con el trabajo para ambos sexos. La falta de apoyo social fue un predictor de RCS entre los hombres.
9	Nelson Yvonne	Roles and value added contributions of the occupational health nurse	Proquest	AAOHN Journal. Tomo 49. Número 3. Páginas 121-129. Marzo 2001	Attitude to Health, Nurse's Role, Occupational Health Nursing, Occupational Health Nursing, Occupational Health Nursing and organization & administration	El propósito de este estudio de replicación fue examinar las percepciones de los funcionarios de las empresas sobre las funciones actuales y futuras de la enfermera de salud ocupacional y el valor añadido de la contribución de la enfermera de salud ocupacional dentro de una gran corporación. Específicamente este estudio fue diseñado para examinar las diferencias en las percepciones de los directores de fábrica frente a ejecutivos de las empresas relacionadas con las actividades actuales y futuras de la enfermera de salud ocupacional, así como las actividades de valor añadido de la enfermera.	Cuantitativo Psicométrico	Los resultados de este estudio son consistentes con estudios previos de Lusk (1988) y Martin (1993), a pesar de que estos otros dos estudios tenían muestras mucho más grandes. Las cinco tareas más frecuentemente realizados surgidos de los tres estudios fueron: 1) Supervisar la prestación de los cuidados de enfermería (89,7%). 2) Asesoría empleados sobre los riesgos de salud (87,7%). 3) El seguimiento de las reclamaciones de indemnización de los trabajadores (67. 1%). 4) Realización de evaluaciones periódicas de la salud (62,6%). 5) La evaluación de retorno seguro al trabajo (62,6%).

10	Tolosa-Guzmán I, Romero ZC, Mora MP	Predicción clínica del dolor lumbar inespecífico ocupacional	Scielo	Revista Ciencias de la Salud, vol. 10, núm. 3, 2012, pp. 347-368. Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia	Predicción del dolor lumbar, dolor lumbar ocupacional, reglas de predicción clínica y factores de riesgo.	Determinar los factores predictores del dolor lumbar inespecífico ocupacional (DLIO), así como el tipo de instrumentos referidos en la evidencia científica y establecer los alcances de la predicción.	Revisión de literatura	La mayoría de los trabajadores con DLIO tiene una larga historia de enfermedad, asociadas con incapacidades laborales y tratamientos encaminados muchas veces a controlar el dolor, mas no a controlar las causas, por lo cual las intervenciones clínicas son ineficaces para el retorno al trabajo, prolongando el ausentismo laboral, con un gran impacto en la calidad de vida del trabajador. Es importante diseñar un modelo de predicción del DLIO que desde la evaluación fisioterapéutica integre predictores funcionales con pruebas que permitan identificar de manera temprana factores de riesgo físicos, biomecánicos, psicológicos, sociales y ocupacionales que junto con las características antropométricas y los estilos de vida establezcan la predicción del dolor lumbar en el trabajador.
11	Verdolini and Ramig	Review: Occupational risks for voice problems	EPSCO HOST	Log Phon Vocol 2001; 26: 37-46	Voice disorders, occupation, risk, teacher, singer, repetitive strain injury.	El propósito de este trabajo es ofrecer una revisión de la literatura en relación con las consecuencias funcionales de los problemas de voz y de los factores de riesgo ocupacional para ellos.	Revisión de literatura	Las estimaciones basadas en datos empíricos sugieren que, teniendo en cuenta los días de trabajo perdidos y sólo los gastos de tratamiento, el costo social de los problemas de voz en los docentes están alrededor de \$ 2,5 mil millones al año en los EE.UU. De hecho, la mayoría de los países, los maestros son la ocupación más común propensa a buscar la evaluación otorrinolaringológica (ORL) para un diagnóstico de problema de voz. Otras categorías profesionales que puedan solicitar el examen ORL son el cantante, el consejero o trabajador social, abogado y el clero.
12	SMOLANDER & HUTTUNEN	Voice problems experienced by Finnish comprehensive school teachers and realization of occupational health care	EPSCO HOST	Logopedics Phoniatics Vocology. 2006; 31: 166-171	Professional voice user, speech therapy, survey, symptom, voice disorder, voice therapy	El propósito de este estudio fue investigar el número y la naturaleza de los problemas de voz que experimentan los profesores escolares finlandeses. Por otra parte, identificar los factores de riesgo de trastornos de la voz, junto con la necesidad percibida de la atención médica y los cuidados apropiados en salud en el trabajo para esta necesidad. El estudio también tuvo como objetivo explorar el nivel de competencia de los médicos de atención de la salud en el trabajo, sus opiniones sobre la prevalencia de los problemas de la voz de los docentes, y el tratamiento de los trastornos de la voz forma organizada.	Cuantitativo Psicométrico	De los 181 profesores que respondieron, el 42% reportó síntomas de la voz que ocurren a diario o semanalmente. Uno de cada diez maestros también tenía nódulos vocales, y el 40% de los que tienen problemas de voz recurrentes habían sido retirados por la enfermedad. Los encuestados no solo sugirieron mejoras en la atención de la salud en el trabajo, sino que también debe abarcar la prevención, los tiempos de espera deben ser acortados, cadenas de cuidado establecidas y necesitan recursos que deben asignarse a los servicios de terapia de voz.

13	The State of Queensland (Department of Justice and Attorney-General)	A practical guide for school leaders	Google Academic	PN10924 Version 3 Last updated June 2011	Ninguna	Empezar a trabajar en el reto de mejorar el desempeño en salud y seguridad de las escuelas. La Salud y seguridad no es un asunto complejo que sólo puede ser entendido por especialistas capacitados o que necesita un compromiso financiero significativo para hacer mejoras. Se puede integrar en los procesos escolares existentes . El compromiso de los líderes escolares, consultar con el personal e identificar , priorizar y actuar sobre temas clave, son la manera para lograr mejoras tangibles en la salud y seguridad en el trabajo en las escuelas.	Guía Basada en la Evidencia	No llega a ninguna conclusión. Solo ofrece mas información sobre los riesgos en el colegio.
14	McCauley	Research to Practice in Occupational Health Nursing	Proquest	Workplace health & safety .Vol . 60, no. 4, 2012	Ninguna	En este artículo se describe la historia de la investigación en enfermería en general, y resalta las carencias nacionales actuales que deben ser abordadas para garantizar que las enfermeras siguen impactando en este campo. Las prioridades de enfermería en salud ocupacional se describen y se dan de manera científica, por ende, este artículo da ejemplos de la investigación en enfermería este campo, ilustrando experiencias variadas y el contexto interdisciplinario en el que se lleva a cabo esta obra.	Revisión de literatura	De la misma forma que en la ciencia de enfermería los recursos científicos son insuficientes, la investigación en enfermería de salud ocupacional se ha visto limitado por los pocos doctorados que preparen a enfermeras científicas. Sin embargo, en las últimas tres décadas, han surgido enfermeras líderes en la parte científica. Las revistas en que se publica la investigación en enfermería de salud ocupacional son amplias y reflejan el contexto interdisciplinario en el que muchas enfermeras científicas realizan su trabajo. Varias enfermeras están utilizando métodos de investigación participativa basada en la comunidad para acceder a las poblaciones trabajadoras vulnerables. Las prioridades de investigación para enfermeras de salud ocupacional se han actualizado recientemente, y está claro que están teniendo un impacto significativo en la mayoría, si no todas, las áreas prioritarias.
15	Mesquita, Ávila, Barreto	Absenteeism due to voice disorders in female teachers: a public health problem	Proquest	Int Arch Occupational Health And Safety. Noviembre 2012	Absenteeism, Voice disorders, Teacher, Associated factors, Teaching profession, Occupational health	Este estudio estima la prevalencia de ausentismo debido a trastornos de la voz entre los profesores de primaria del Sistema Escolar Municipal de Belo Horizonte (MSSBH), Minas Gerais, Brasil; investiga los factores individuales y contextuales asociados.	Cuantitativo descriptivo Transversal	El absentismo por voz en las 2 semanas anteriores se informó por 66 profesores ( 3,35 %). Durante toda su carrera, aproximadamente un tercio de los profesores se perdió el trabajo por lo menos una vez debido a problemas de voz.

16	Mediouni Z, Roquemaurel A, Dumontier C, Becour B, Garrabe H, Roquelaure Y, et al.	Is Carpal Tunnel Syndrome Related to Computer Exposure at Work?	Ovid	JOEM. Volume 56, Number 2, February 2014	Ninguna	Se realizó un meta- análisis de estudios epidemiológicos para evaluar la asociación entre el síndrome del túnel carpiano (CTS) y trabajo en el computador.	Revisión de literatura- Metaanálisis	Seis estudios cumplieron los criterios de inclusión. Los resultados son contradictorios debido a la exposición de trabajo heterogéneo. Se llegó a la conclusión de que no se ha podido demostrar una asociación entre el uso de la computadora y CTS , aunque algunas circunstancias particulares de trabajo pueden estar asociados con CTS.
17	Kooijman P, Thomas G, Graamans K, de Jong F	Psychosocial impact of the teacher's voice throughout the career	Science Direct	J Voice, 21 (2007), pp. 316–324	Teacher, Teaching years, Voice complaints, Voice handicap, Psychosocial impact.	El objetivo de este estudio fue investigar el curso de los reclamos de voz y el ausentismo de trabajo debido a los problemas de voz a través de los años de enseñanza.	Cuantitativo descriptivo Transversal	Los profesores a lo largo de su carrera no mostraron reclamos comparado con los profesores en el comienzo de su carrera. En contraste con las expectativas, se ha encontrado incluso una disminución del nivel de reclamos. Esta tendencia se encontró en las tres categorías de tiempo: en el momento de la investigación, durante el año pasado, y más temprano en su carrera. Estos resultados son notables en comparación con los datos en la literatura. Las profesoras a lo largo de la carrera profesional no reclaman muy a menudo, no muestran una puntuación en el índice de incapacidad vocal comparado con las puntuaciones en el último período de la carrera.
18	Russell A, Oates J, K.M. Greenwook K	Prevalence of voice problems in teachers.	Science Direct	J Voice, 12 (1998), pp. 467–479	Occupational health, Voice Teachers, Prevalence, Professional voice users.	Este estudio investigó la prevalencia de los problemas de voz por medio de auto-reporte de los profesores usando una encuesta por correo a una muestra aleatoria simple de 1.168 maestros de escuelas estatales (educación preescolar al grado 12 ) en el sur de Australia.	Cuantitativo descriptivo Transversal	Las mujeres tenían el doble de probabilidades que los varones reportar problemas de la voz . Estos resultados indican claramente la necesidad de mayor investigación de las causas de la disfunción vocal de los maestros. una parte de estos problemas están relacionados con la enfermedad aguda ; sin embargo, una gran parte puede ser prevenible, y los programas de prevención deben ser desarrollados y evaluados . Se necesitan más estudios para comprender qué factores contribuyen a estos problemas de la voz (por ejemplo, los patrones de uso de voz, hidratación, salud , etc ).

19	Mattiske, Oates J, Greenwood K	Vocal problems among teachers: a review of prevalence, causes, prevention and treatment	Science Direct	J Voice, 12 (1998), pp. 489-499	Voice disorders, Teachers, Vocal attrition.	Esta revisión de una investigación publicada, demuestra que las conclusiones referentes a la prevalencia de los problemas de la voz en los docentes, las causas y los factores de los problemas de voz que contribuyen, son concluyentes.	Revisión de literatura	Las causas de este tipo de problemas en los profesores y cómo se relacionan entre sí, no se han establecido firmemente. También hay evidencia limitada que apoya la eficacia de los enfoques de tratamiento preventivo, educativo y directos para hacer frente a los problemas de la voz en el personal docente. Hay, pues, muchas deficiencias en los conocimientos actuales que deben corregirse mediante una mayor investigación para que los médicos tengan una base sólida para su trabajo con esta población. Sólo entonces se tendrá la opción de desarrollar programas eficaces de prevención y educación para los maestros.
20	González J.	Aplicación del proceso de atención de enfermería a la salud laboral	Scielo	Medicina y seguridad del trabajo. Med Segur Trab (Internet) 2011; 57 (222) 15-22.	Nursing care process, occupational health, occupational nursing, nursing diagnosis, care plan, prevention.	Como objetivo general planteamos la demostración de la aplicación en el ámbito laboral y dentro de las competencias y funciones de la Enfermería del Trabajo, de las cinco etapas que componen el Proceso de Atención de Enfermería, como herramienta enfermera y esquema estructurado de prestación de cuidados, en este caso al trabajador.	Cualitativo Interpretativo	El PAE, tiene aplicación en todas y cada una de sus etapas en el ámbito de la salud laboral, favoreciendo: *El Enfermero, ya que como especialista del ámbito de la salud, viene obligado a realizar sus funciones enfermeras, acorde al grado de diligencia exigible a una mayor cualificación profesional. *Continuidad de la atención al trabajador, puesto que la característica dinámica de este Proceso de Atención de Enfermería, obliga a trabajar sobre las situaciones nuevas que puedan afectar al trabajador. *Participación por parte del trabajador en la toma de decisiones y colaboración para su propia salud y mejora de su lesión. *Prestación de cuidados con más calidad, aumentado la eficiencia y la eficacia del trabajo

21	Rogerson J, Dodd B	Is there an effect of dysphonic teachers' voices on children's processing of spoken language?	Science Direct	J Voice, 19 (2005), pp. 47-60	Teachers, Children, Vocal impairment, Speech perception, Comprehension, Education.	El propósito de este estudio fue investigar el efecto de la alteración de la calidad de voz en el procesamiento del lenguaje oral de los niños. Ciento siete niños (rango de edad, 09.02 a 10.06 , media 9.8,76 meses ) escuchó tres pasajes de video, una lectura en voz sin alteración, uno con disfonía leve en la voz y otro con disfonía severa. Después de cada paso dinámica, se les pidió a los niños responder seis preguntas, con respuestas de selección múltiple.	Cuantitativo Psicométrico	Los resultados indican que las percepciones de los niños sobre el habla a través de las tres cualidades de voz diferían, sin importar el género, el coeficiente intelectual y la escuela. El comportamiento en los pasajes vocales de control fue mejor que el comportamiento en los pasajes de voz con disfonía leve y grave. Se destaca que cualquier forma de alteración vocal es perjudicial para el procesamiento del habla de los niños y por lo tanto es probable que tenga un efecto pedagógico negativo. Estos hallazgos, en vista de la alta tasa de disfunción vocal de los maestros, apoyan aún más la implementación de la educación del cuidado de voz específica para aquellos en la profesión docente .
22	Shield B; Greenland E, Dockrell J	Noise in open plan classrooms in primary schools: A review	Proquest	Noise & Health 12.49 (Oct 2010): 225-34.	Acoustics, classrooms, noise, open plan, schools, speech intelligibility	Este artículo presenta una revisión de la investigación llevada a cabo en los últimos 40 años en varios aspectos de ruido en las aulas de planta abierta. Se discute el surgimiento del diseño abierto de los salones de clases como respuesta a las reformas educativas progresistas.	Revisión de literatura	Los estudios de las aulas de planta abierta en los últimos 40 años han demostrado que el ruido intrusivo de las clases adyacentes es un problema importante para la reducción de la inteligibilidad del habla, la privacidad, propende la distracción y la no satisfacción de los alumnos y los profesores . Las mediciones de los niveles de ruido se han mantenido notablemente constante durante estos años y muestran que es necesario adoptar medidas de control de ruido para minimizar la distracción y la molestia causada por el ruido. Técnicas efectivas incluyen la instalación de un techo absorbente a una altura de 3,5 m como máximo , la disposición lineal de bases, repartidas entre ellas para lograr suficiente distancia entre las aberturas y la atenuación acústica (es decir , plan de diseño semi -abierto), lo que limita el número de bases a tres o menos y proporcionar espacio suficiente por niño.

23	Useche L.	Propuesta sobre el papel del profesional de enfermería en salud ocupacional.	Proquest	Avances en enfermería VOL. XIV No. 1	Papel (rol)/Role, Enfermería/Nursing, Salud Ocupacional/Occupational Health.	El presente artículo intenta formular una propuesta que aporte a la construcción de un modelo de intervención de Enfermería en Salud Ocupacional en Colombia. La importancia de este estudio se basa en la necesidad de proporcionar a profesionales y estudiantes un marco de referencia que oriente la práctica de Enfermería en Salud Ocupacional, ya que los estudios y escritos sobre el tema son extremadamente escasos en nuestro país.	Revisión de literatura	Es necesario que el trabajador participe en el establecimiento de metas e intervenciones con el fin de conservar su sentido de control del Proceso, asumiendo así responsabilidad en el cuidado de su salud. Para esto es necesario llevar a cabo una interacción que permita la comunicación libre y la confianza suficiente entre el profesional y el trabajador. El trabajador requiere tener una percepción correcta del problema, del tratamiento y de las alternativas posibles.
24	Erick N, Smith D	A systematic review of musculoskeletal disorders among school teachers	Proquest	BMC Musculoskeletal Disorders 2011, 12:260	Musculoskeletal Diseases, Occupational Diseases, Prevalence, Risk Factors, teachers	El objetivo de esta revisión sistemática fue investigar la prevalencia y los factores de riesgo para los MSD entre el personal docente. Utilizando como método una extensa búsqueda en bases de datos MEDLINE y EMBASE en 2011	Revisión de literatura	En general, este estudio sugiere que los maestros de las escuelas están en un alto riesgo de MSD. La investigación concluye que es necesario investigar más a fondo el tema de la MSD entre los docentes, con un mayor énfasis en el uso más amplio de los principios ergonómicos. Esto representaría un gran paso adelante en la prevención de estas enfermedades, sobre todo si oportunamente se ponen en práctica medidas de control para dicho riesgo.
25	Rivera L	Autocuidado y capacidad de la agencia del autocuidado	Google Academic	Avances en enfermería VOL. XXIV No. 2. Julio a Diciembre del 2006	Autocuidado, Capacidad de agencia de autocuidado, Dorothea Orem	Se analizan los conceptos de la teoría de Orem, quien desarrollo a lo largo de su experiencia académica y profesional la teoría del déficit de autocuidado. El ser humano debe estar en la capacidad de comprender la importancia del cuidado para el mantenimiento de su salud. De igual manera, se requiere que la enfermera entienda que el autocuidado es un derecho humano de cada individuo.	Revisión de literatura	Como conclusión plantean algunas recomendaciones que puedan potenciar el desarrollo de programas de educación sobre las capacidades de agencia del autocuidado en el individuo con las características de genero, ciclo vital humano y cultura.
26	Cardosol J, Ribeiro I, Araújo T, Carvalho F, Reis E.	Prevalence of musculoskeletal pain among teachers	PubMed	Rev Bras Epidemiol 2009; 12(4): 1-10	Teacher; occupational health, education, low back pain, back pain.	Este artículo describe la prevalencia de dolor musculoesquelético en función de variables sociodemográficas y ocupacionales entre los maestros de escuelas primarias. El estudio transversal incluyó a todos los 4.496 profesores de la escuela de la primaria municipal de la red de educación de Salvador, Bahía, Brasil.	Cuantitativo descriptivo Transversal	La prevalencia del dolor musculoesquelético se asoció con las siguientes variables ocupacionales: trabajar durante cinco años en el colegio, alto nivel de esfuerzo físico, no tener una actividad distinta de la enseñanza y la presentación de informes de clases. Los hallazgos se basan en la atención hacia la necesidad de adoptar políticas públicas para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes.

27	Carayanni V, Kalogeraki A, Babatsikou F, Chalkias A, Koutis C.	Covariates of occupational accident occurrence in the restaurant sector in Greece: the case of the restaurants in the Piraeus municipality	Proquest	Health Science Journal 5.3 (2011): 196-203.	Accidents, occupational, restaurants, prevalence, risk factors	Los riesgos a que están expuestos la población activa en el sector de restaurantes varían, ya que realizan distintos tipos de trabajos. El objetivo de este estudio es estimar la prevalencia de los accidentes de trabajo en los restaurantes del municipio de El Pireo Attica e investigar los factores de riesgo de ser heridos.	Cuantitativo descriptivo Transversal	Los resultados mostraron que los factores del entorno psicosocial, salud e integridad física de trabajo constituyen los factores predictores de la incidencia de los accidentes de trabajo.
28	Aguilar M, Pérez G, González G	Enfermedades potenciales derivadas de factores de riesgo presentes en la industria de producción de alimentos.	Proquest	Med Segur Trab (Internet) 2011; 57 (225) 300-312	Enfermedades, factores de riesgo laboral, salud ocupacional.	El propósito de esta publicación es evidenciar los factores de riesgos presentes en la industria de los alimentos y las enfermedades que estos pueden generar, y que frecuentemente son calificadas como enfermedades generales cuando en realidad son laborales, y así proporcionarle fundamentos sólidos según referencias nacionales e internacionales para un diagnóstico situacional y de salud más completo.	Revisión de literatura	Con referencia al orden que se dio a los padecimientos es importante hacer mención que la incidencia reportada en la Unión Americana es, en orden de importancia: lesiones musculoesqueléticas, lesiones dermatológicas, alteraciones mentales, alteraciones respiratorias, pérdida de la audición. En lo que respecta al diagnóstico adecuado de las enfermedades ocupacionales la medicina en la sociedad contemporánea puede estar fallando ya que los médicos no escuchan más allá de lo que los pacientes les dicen. Un acercamiento intuitivo a la clínica laboral engloba las áreas racional y emocional que el paciente refiere y que el médico debe tener siempre en cuenta
29	Reddy R, Welch D, Thorne P, Ameratunga S.	Hearing protection use in manufacturing workers: A qualitative study.	Proquest	Noise & Health 14.59 (Jul 2012): 202-9.	Barriers, behavior, hearing protection devices, noise-induced hearing loss, supports	El propósito de este estudio fue conocer los factores que influyen en el uso de dispositivos de protección auditiva entre un grupo de trabajadores de producción en Nueva Zelanda. Una muestra intencional de veinticinco trabajadores fue reclutado para participar en entrevistas semi-estructuradas. Las preguntas abiertas estaban destinadas a la exploración de los conocimientos de los participantes, actitud, creencias y comportamiento hacia el ruido y el HPD	cuantitativo Fenomenológico	La percepción del ruido, la preservación de la audición, la renuencia a utilizar difusores de alta presión, la interacción del lugar de trabajo, y el valor de la audición) describen diversos factores que influyen en el uso de protección auditiva. Factores personales y ambientales influyen en el uso de EPPs. Sobre la base de este estudio, los factores personales y ambientales deben ser objeto de mayor investigación utilizando modelos ecológicos para desarrollar intervenciones que promuevan el uso de protectores entre los trabajadores.

30	Mahan P, Mahan M, Park N, Shelton C, Brown K, Weaver M.	Work Environment Stressors, Social Support, Anxiety, and Depression Among Secondary School Teachers.	Proquest	AAOHN Journal. Vol. 58, No. 5, 2010	safety in the school environment, anxiety, depression, teachers.	El propósito de este estudio fue examinar las relaciones entre los factores de estrés y ansiedad y depresión , así como el grado en que la ansiedad y la depresión pueden ser predichos por los factores de estrés y compañero de trabajo y el apoyo del supervisor en curso y episódicos	Cuantitativo descriptivo Transversal	Los tres factores de estrés más frecuentemente citados identificados en este estudio fueron la falta de seguridad en el entorno escolar , compañeros de trabajo hostiles y los alumnos desmotivados . El fracaso de los estudiantes al hacer el trabajo en clase, las tareas incompletas y tardanzas del estudiante, fueron los tres factores de estrés episódicos citados con mayor frecuencia por los profesores de enseñanza secundaria.
31	Sharron L, Mak Y, Chiang V, Chui C, Sun S, Wong D.	Health Promotion Program for Secondary School Teachers in Managing Their Work-Related Stress	Virginia Henderson International Nursing e-Repository	Sigma Theta Tau International. The University of Hong Kong. 2008	Ninguna	Este estudio informa de un programa de promoción de la salud realizada por enfermeras utilizando el enfoque cognitivo-conductual para el manejo del estrés. Ciento noventa y profesores fueron reclutados de 3 escuelas secundarias de Hong Kong.	Cuantitativo descriptivo Correlacional	Los maestros informaron altos niveles de estrés , depresión y ansiedad ( 12 % , 8 % y 24 % , respectivamente). El Pensamiento disfuncional resultó ser un predictor significativo de estrés, depresión y ansiedad. Después de haberse controlado el estrés, seguía el patrón de pensamiento disfuncional, por género y edad. Más del 60 % de los participantes informaron que habían aprendido a pensar de manera más racional ; cerca de la mitad de ellos estuvieron de acuerdo en que el programa ha mejorado su confianza en el manejo del estrés . Más de la mitad opina que el programa les ayudó a explorar nueva forma de controlar el estrés y estaban planeando usar nueva forma de gestionar el estrés laboral.
32	Vargas P, Orjuela M y Vargas C	Lesiones osteomusculares de miembros superiores y región lumbar: caracterización demográfica y ocupacional. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2001- 2009	SciELO	Enfermería Global. Nº 32 Octubre 2013. ISSN 1695-6141	Lesiones osteomusculares, Miembros superiores, región lumbar, factor de riesgo ocupacional.	Caracterizar variables demográficas y ocupacionales de casos de lesiones osteomusculares de miembros superiores y región lumbar	Cuantitativo descriptivo Transversal	Escoliosis e hiperlordosis fueron las alteraciones de columna vertebral con mayor frecuencia entre la población participante. La mejoría y/o desaparición de los síntomas con descanso y reaparición o agravamiento durante el trabajo fue el criterio más representativo para considerar posible origen laboral de casos de lesiones osteomusculares para miembros superiores y región lumbar. El conocimiento de las variables asociadas a lesiones osteomusculares permite realizar intervenciones preventivas.

33	Garg A, Hegmann K, Wertsch J, Kapellusch J, Thiese M, Bloswick D, et al.	The WISTAH hand study: A prospective cohort study of distal upper extremity musculoskeletal disorders	EPSCO HOST	BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:90	Epidemiology, Ergonomics, Cohort, Carpal tunnel syndrome, Strain index, TLV for HAL	Se han realizado pocos estudios de los trastornos musculoesqueléticos de las extremidades distales superiores. Estudios anteriores han evidenciado un tanto contradictoria de factores de riesgo laboral y han informado ampliamente de datos sin ajustes por muchos factores.	Cuantitativo Longitudinal prospectivo	La prevalencia puntual del síndrome del túnel carpiano es una combinación de parestesias en dos nervios medianos digitales más una conducción nerviosa anormal al inicio del estudio. El tiempo de vida de incidencia acumulada del síndrome del túnel carpiano también incluirá aquellos con antecedentes de síndrome del túnel carpiano. Los casos incidentes excluirán aquellos ya sea con una historia pasada o casos prevalentes al inicio del estudio .
34	Sein Oh, Kim H, Kwak J, Kim T, Ho Jang S, Lee K, et al.	Causes of Hand Tingling in Visual Display Terminal Workers	PubMed	Ann Rehabil Med 2013;37(2):221-228 pISSN: 2234-0645	Hand tingling, Myofascial pain syndromes, VDT workers, Pressure pain threshold	Este artículo tiene la intención de ofrecer información básica acerca de las causas y la distribución de adormecimiento de la mano , los síntomas y hallazgos físicos , y el umbral de dolor a la presión en los trabajadores de escritorio.	Cuantitativo Psicométrico	La causa más común de adormecimiento de la mano de los trabajadores de la recepción fue el síndrome de dolor miofascial en lugar de síndrome del túnel carpiano. Puntos gatillo comunes para evocar adormecimiento de la mano estaban en el trapecio infraespinoso y superior.
35	Salazar CA.	Aspectos normativos en la legislación Colombiana para la determinación como enfermedad profesional del estrés laboral.	Dialnet	Rev CES Salud Pública 2011; 2(1): 85-90	Estrés Psicológico, Agotamiento Profesional, Legislación Laboral, Salud Laboral	El estrés laboral cobra cada día más importancia dentro de las patologías que sufre la población laboral en el mundo, por ello el médico especialista en medicina laboral debe saber reconocerlo y conocer las normas legales que le aplican. Se esperaría que las patologías derivadas del estrés aparecieran entre las principales patologías diagnosticadas y calificadas por las Aseguradoras de Riesgos Profesionales (ARP), pero esto, no es así. Los principales diagnósticos de enfermedad profesional en el país han sido las patologías osteo-musculares.	Artículo de reflexión	Este repaso legislativo demuestra que en Colombia se ha planteado el estrés como enfermedad profesional, de que existe un reconocimiento a la misma y que merece de todos los médicos laborales pensar en ella y diagnosticarla adecuadamente para evitar más deterioro en la población laboral activa.
36	Ministerio de la Protección Social	Guía de Atención Integral Basada en la Evidencia para Hombro Doloroso (GATI- HD) relacionado con Factores de Riesgo en el Trabajo	Google Academic	Bogotá, Diciembre de 2006	Ninguna	Emitir recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo integral (promoción, prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación) del Hombro Doloroso relacionado con los factores de riesgo de la actividad laboral.	Guía Basada en la Evidencia	Las mencionadas Guías, como su nombre lo indica, se han elaborado desde un enfoque integral, es decir, que emiten recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible para prevenir, realizar el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación de los trabajadores en riesgo de sufrir o afectados por las enfermedades profesionales objeto de las GATI - SO.

37	Klussmann A, Steinberg U, Liebers F, Gebhardt H, Rieger M	The Key Indicator Method for Manual Handling Operations (KIM-MHO) - evaluation of a new method for the assessment of working conditions within a cross-sectional study	EPSCO HOST	BMC Musculoskeletal Disorders 2010, 11:272	Ninguna	El desarrollo de este KIM - MHO se basó en una revisión exhaustiva y crítica de la literatura de los distintos métodos. Este conocimiento se combina con entrevistas a los científicos, los supervisores de las agencias estatales y las asociaciones de profesionales, médicos del trabajo, funcionarios de salud y seguridad en el trabajo y directivos de empresas de diversos sectores sobre las clases típicas expuesta y estructuras de Operaciones de manipulación manual.	Revisión de literatura	Este proyecto de investigación proporcionará una justificación científica y en su caso, la modificación de un nuevo método para evaluar las operaciones de manipulación manual en los lugares de trabajo. Además, se ampliará el conocimiento acerca de la correlación entre los factores relacionados con el trabajo y los diferentes trastornos musculoesqueléticos en la región de las extremidades superiores. Con este conocimiento, en el futuro, se puede clasificar los riesgos laborales en lo que respecta a las enfermedades musculoesqueléticas de las extremidades superiores. Esto podría llevar a estrategias de prevención más específicas.
38	Ogido R, Costal E, Machado H.	Prevalence of auditory and vestibular symptoms among workers exposed to occupational noise	Scielo	Rev Saúde Pública 2009;43(2)	Noise, Occupational, adverse effects. Hearing Loss, Noise-Induced, Occupational Risks, Occupational Health. Epidemiology.	El propósito del estudio fue evaluar la prevalencia de síntomas auditivos y vestibulares en trabajadores expuestos al ruido en el trabajo.	Cuantitativo descriptivo Transversal	Las variables estudiadas fueron la frecuencia de los síntomas de hipoacusia, acúfenos y vértigo. Asociación con la edad, el tiempo de exposición al ruido y límites auditivos tonales fueron analizados mediante la prueba de cuadrado de Chi y la prueba exacta de Fisher. Fueron reportados hipoacusia en 74% de los casos, zumbidos en 81% y vértigo en 13,2%. No se encontró una asociación entre hipoacusia y edad, tiempo de exposición al ruido y límites auditivos tonales y entre vértigo y tiempo de exposición de ruido. No se encontraron otras asociaciones significativas.
39	Sánchez A, Abellán M	Protocolo para la vigilancia de la salud del profesorado con atención a la enfermedad profesional.	Scielo	Med Segur Trab 2008; Vol LIV Nº 211: 47-60	Vigilancia de la salud, Riesgos ocupacionales en Docentes, Enfermedad profesional, Nódulos de cuerdas vocales.	El objetivo de este trabajo es la propuesta de un protocolo para la vigilancia de la salud del profesorado. Cuestión que surge tras realizar un estudio epidemiológico para conocer la forma de enfermar del profesorado de secundaria, a partir de una muestra representativa, considerando variables de salud laboral. Analizamos la patología más frecuente que aparece en la población encuestada, entre la que figura los trastornos de la voz, incluidos los nódulos de las cuerdas vocales.	Cuantitativo Longitudinal prospectivo	Centrándonos en el apartado de salud laboral, obtenemos datos parecidos en cuanto a la patología más frecuente que existe en la población docente. Destaca el predominio de la patología ORL e Infecciones, seguida de procesos osteomusculares y de alteraciones de salud mental. Especialmente, el que un 32% de los profesores/as encuestados/as (117 docentes) dicen padecer trastornos de la voz (afonías, disfonías)

40	Lerman S, Eskin E, Flower D, George E, Gerson B, Hartenbaum N, et al.	Fatigue Risk Management	Proquest	JOEM. Volume 54, Number 2, February 2012	Ninguna	El propósito de este artículo es proporcionar información para aportar a la medicina Ocupacional y del ambiente. Está diseñado para proporcionar antecedentes , conceptos clave y las referencias necesarias para promover y apoyar un sistema de riesgo para la fatiga (FRMS) . Muchos de estos recursos pueden estar disponibles dentro de una organización o puede que no. Sin embargo, se debe residir con la alta dirección para asegurar un esfuerzo sostenido .	Revisión de literatura	La fatiga del trabajador puede afectar negativamente a la salud y seguridad personal , así como la eficiencia y la seguridad de la operación. El método más eficaz para reducir al mínimo la fatiga del trabajador es a través de un FRMS integrales . Un FRMS requiere la participación activa de todas las partes de la organización, incluida la gestión , las instancias de apoyo y los trabajadores . Al promover y participar en el desarrollo e implementación de un FRMS , el líder puede ofrecer un importante servicio a las organizaciones que apoyan , empleados de dichas organizaciones y las comunidades en las que operan .
41	Organización Internacional del Trabajo.	Riesgos emergentes y nuevos modelos de prevención en un mundo de trabajo en transformación.	Google Academic	ISBN 978-92-2-323343-3 (web pdf). Primera Edición. Ginebra. 2010	Ninguna	En las últimas décadas han tenido lugar importantes avances tecnológicos en el lugar de trabajo, los cuales, junto con la rápida globalización, han transformado el trabajo para muchas personas en todo el mundo. Los efectos de dichos cambios en la seguridad y la salud en el trabajo (SST) también han sido notorios. En algunos casos, se han reducido o eliminado peligros y riesgos más tradicionales, por ejemplo, a través de la automatización industrial, pero las nuevas tecnologías también han creado nuevos riesgos.	Documento	Las normas internacionales del trabajo en materia de SST siguen sirviendo de referencia a los Estados Miembros al elaborar y fortalecer sus sistemas, reglamentos y prácticas nacionales de SST. Dichas normas también proporcionan orientación para hacer frente a los riesgos emergentes, como se describe más arriba, debido a su flexibilidad en la medida en que permiten la aplicación progresiva, teniendo en cuenta los recursos humanos, tecnológicos y económicos disponibles. Esto también lo confirmó el reciente estudio general de la OIT relativo al Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), mencionado anteriormente.
42	Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).	Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC45	Google Academic	Bogotá D.C. 2010.	Ninguna	Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece un modelo claro y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su proceso y sus componentes. Esta guía proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional.	Guía Técnica	No llega a ninguna conclusión.

43	Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT)	ISO 11228-1: Manipulación Manual de cargas	Google Academic	España, 2003	Ninguna	La Norma constituye la Primera Internacionalmente conocida sobre la Manipulación manual y desarrolla metodos de evaluación y recomendaciones ergonomicas para los diferentes tipos de tareas de manipulación de cargas.	Norma Internacional	No llega a ninguna conclusión.
44	Ministerio del Trabajo y seguridad Social	Resolución 2400 de 1979 Vivienda, higiene, y seguridad de sitios de trabajo	Google Academic	Mayo de 1979	Ninguna	Estas Normas se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las leyes que se dicten en cada centro de trabajo, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades.	Ley	No llega a ninguna conclusión.
45	González R.	La enfermera como cuidadora de la salud de los trabajadores	Google Academic	ACTUALIZACIONES EN ENFERMERÍA. Octubre de 2000. - ISSN 0123-5583	Ninguna	Abordar sobre la responsabilidad y compromiso que reviste la función social de la enfermera salubrista ocupacional como cuidadora de la salud de los trabajadores, considerando a éste como realmente es: un ser holístico. El que será abordado para el cuidado de su salud, a partir del conocimiento e interpretación previa de su contexto, de sus características muy propias y específicas, tales como sus actitudes, aptitudes, intereses y motivaciones, etc.	Articulo Reflexivo	Como se puede ver en este articulo, la responsabilidad y el compromiso de la enfermera como salubrista ocupacional es absolutamente grande y complejo, lo cual se constituye en posibilidades inmensas de desarrollo disciplinar y profesional, y en la posibilidad de beneficiar en gran medida a la persona trabajadora, cuando se le invita a participar en ser ella y sólo ella la única responsable de proteger y velar por su propia condición de salud y ejercer su deber de autocuidadora y autogestadora de su cuidado en referencia con su propio contexto.

46	Attewell A.	Florence Nightingale (1820 - 1910)	Google Academic	UNESCO: Oficina Internacional de Educación, 2000. vol. XXVIII, n° 1, marzo 1998, págs. 173-189	Ninguna	En efecto, gracias a Florence Nightingale se generalizó la formación de enfermeras, dando así origen a una nueva profesión para la mujer. Esta leyenda se ha convertido en un capítulo importante de la cultura de la asistencia sanitaria en el mundo entero, pero no ha contribuido a dar a conocer mejor a Florence Nightingale.	Biografía	En uno de sus trabajos, Florence Nightingale citó una frase de una conferencia sobre educación en las universidades de St. Andrew y de Glasgow que resumía perfectamente su propio punto de vista: “[...] educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer” (Nightingale, 1873, pág. 576). Parece justo juzgar la contribución de Florence Nightingale a la educación teniendo en cuenta los resultados concretos de sus reformas.
47	Amaro M C.	Florence Nightingale, la primera gran teórica de enfermería.	Scielo	Rev Cubana Enfermer 2004;20(3)	Filosofía, teoría, enfermería.	Este trabajo tiene como objetivo analizar la lógica del pensamiento de la fundadora de la enfermería profesional y las bases filosóficas, tanto epistemológicas como éticas de su teoría, a partir del análisis del propio contexto histórico sociocultural en el cual se desarrolló esta personalidad histórica. Para el análisis se ha realizado el estudio de su principal obra y su epistolario, además de fuentes secundarias de teorías más recientes, quienes han desarrollado sus propias teorías y modelos a partir de la lógica del pensamiento nightingaleano.	Revisión de literatura	Aún cuando pudiera aducirse que la teoría de enfermería de Nightingale es pobre, vista a la luz del desarrollo científico-técnico actual, no es posible obviar que esta teoría ha servido de punto de partida para desarrollar todas y cada una de las actuales teorías de enfermería; pero sobre todo, merece el profundo reconocimiento de haber sido la pionera del pensamiento científico y ético en enfermería.
48	Gil P	Riesgos psicosociales en el trabajo y salud ocupacional	Scielo	Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2012; 29(2):237-41.	Salud ocupacional; Psicología; Estrés laboral; Enfermedades ocupacionales	Los cambios que han ocurrido en las últimas décadas sobre los procesos laborales y el diseño del trabajo son de carácter sociodemográfico, económico, político, y tecnológico. Estos cambios han originado nuevos riesgos psicosociales en el trabajo que afectan a la salud y la calidad de vida laboral. El objetivo del estudio es presentar este tipo de riesgos, sus consecuencias, y algunas recomendaciones para promover la salud en el trabajo como estrategia para mejorar la salud pública de la población.	Revisión de literatura	No llega a ninguna conclusión.

49	Ministerio de	Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y de Trabajo en el Sistema general de Riesgos Laborales.	Google Academic	Bogotá D.C, ene 20/2014.	Ninguna	El estudio realizado con recursos del Fondo de Riesgos laborales, mediante un convenio de cooperación entre el Ministerio del Trabajo y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, OISS, señala que el segundo lugar de las lesiones en el trabajo lo ocupan los accidentes ocasionados por la realización de deportes que es del 1.7% y el 5% por otras causas recreativas. Cifras reportadas de los últimos 3 años.	Informe	La Segunda Encuesta Nacional de Condiciones de Salud y de Trabajo en el Sistema general de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, está enmarcada en la estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2010-2013, lo cual permite potencializar la prevención de riesgos laborales, garantizando el derecho de las personas a la vida y a la integridad física, explicó la funcionaria Andrea Torres Matiz.
50								
50	Posada E	La relación trabajo- estrés laboral en los Colombianos	Scielo	Rev CES Salud Pública 2011; 2(1): 66-73	Trabajo, Condiciones de Trabajo, Estrés Psicológico, Salud Laboral	El estrés laboral, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan en el mundo casi un 35% de los trabajadores, los estudios indican que entre 50% y 60% de las bajas laborales están relacionadas con el mismo. Ello representa un enorme costo, tanto en sufrimiento humano como en perjuicios económicos.	Artículo de reflexión	En los diferentes ámbitos en que se desarrolla el ser humano se presentan circunstancias que generan estrés, una de las áreas que actualmente es perjudicada por este fenómeno es el aérea laboral, especialmente cuando los individuos no están preparados para cumplir con las demandas del medio, por lo que es urgente que las organizaciones tomen en cuenta que la mejor forma de evitar la presencia de estrés laboral es comenzar a implementar y hacer viable metodologías encaminadas a la prevención y manejo del estrés.





























