S. Reg.ª D. D. Jasf Maria Enriquez mi Dueno. 2

Dueño de todo mi aprecio: Ciento mucho q se aya ido a hallar con enfermos, q atrazan, y mortifican; pero ama, y cada dia mas ña conociendo el Alivio, y consuelo, q tiene con la practica, q ha adquirido, q ojala tuviera ỹo en principio, disposicion, y entendim.to pero estos son dones de Dios, q no los podem.os adquirir, y asi me avergüenzo, como otras voz. le he dho sin ynbolo, de q vmd me consulte: Mas por cumplir con lo q me manda devo decir, q para las intermitentes, he experimentado, muy util, el uzo de las limonadas, siendo Viliosas, y q este, no dañe sea notable a la piruitosas, aunq no produce el efecto, q con ellas se soluira de contarlas. Lo mismo mi hermd. Dr. Jph me ha dho q tambien hade servir a Ordoñez la receta la responde en vulgar, para el, con venia de vmd.

Luego q da el escalofrio, o q se siente alguna destemplanza, para entrar la calentura, p.r ligera, q sea la destemplanza, como los rostezos, ỹlo ala punta dela nariz, o a las puntas de los dedos de las manos, o de los pies, o alas rodillas, o arge-nezes, se le dara bastante limonada caliente, (aunq sea vinagrada) fria, aunq sea vinagrada, para q vomiten, con lo qual aun se toma indicac.n dela calidad dela intermitente, vulgo frio, y calenturas, observando el vomito, q mientras mas colera se echa (como dicen) es mejor, y haciendo vomitar anto.

Despues de quatro horas q aya entrado la calentura, se le da dos limonada fria hecha, en agua de la Fuente, dandole cada cuarto de hora dos otras onzas de dha limonada fria hasta q se quite la calentura, o venga otra accecion, q si volviera a entrar la calentura, con lo qual se ejecute, o debe repetir la limonada fria, p.a volver a vomitar,

y de allí volver a seguir el metodo de repetir la frica cada cuarto de hora como queda dho.

Con esto ya se ha observado la hora dela accesion, o del escalofrio, ô de tercianeza, q es el principio dela fiebre. Y si con esto no se han contado las Calenturas intermitentes, se bará vn vomitorio de Tartaro en vn goquillo de agua tibia, seis horas antes de aquella, q entra la calentura. Y auiendo hecho el primer vomito sele dara al enfermo bastante agua, para q vomite, q es el segundo modo, q tengo observado de contar dhas Calenturas.

Si con esto no se hubieren contado dhas Calenturas, ya es menester hechar mano dela Cascarilla, con la q me ha ido bien usando el metodo modeno, q es mas cenzillo, y facil, y como se sigue.

Auiendo pasado el escalofrio, y entrado ia bien, la calentura se da vn pasellito de Cascarilla, q es del peso de seis tomines de oro; A las dos horas despues de haver tomado el primer pasellito se da el Segundo: A las tres horas despues del segundo, se da el tercer pasellito: Y de allí en adelante de quatro, en quatro horas hasta q se quite la calentura; q entonces, ya no seda mas. Mas si buelbe la calentura se buelben adar con el mismo methodo, y orden que queda dho, y con q efectivamte se quita qualquiera especie de intermitentes, bien sean pituitozas, Viliozas, perniciozas, o sincopales, q son las mas agudas, y graves. O por lo menos en las dos destas vltimas especies, se corta la dia executiva, y quedando en vna dia Ordinaria, dan tpo a q se curen.

De lo principal, q se hade observar es el abrigo, y q el enfermo se mantega en cama, con el, para abria pocos, y con

tan nueva constipación, p.r q las mas vezes se originan dellas las intermitentes, y aun q benga de otra causa, como empacho, efervecencia dela sangre &.a q̃ hazen caiér p.r subor otrans-piracion. Y la recaydas mas frequentes, son por nueva constipa-ción, vulgo resfrio.

La comida sera de Caldos mientras dunare la accecion, y fuera della carne platano verde bien cozido, o ahogado, o sancocho, y tortilla. Y el agua de la tinaja Toda la q̃ quisiere el enfermo, sin escasezuela.

Si huviere decubito a cerebro, q̃ es q.do ay delirio, modorra, o q̃ se privan con la calentura son las mas graves, y es menester hazer los confesar p.r q̃ ay peligro, como q.do con la calentura les viene vn sudorcito frio, p.r la cara, o frente, y pegajoso, q̃ estas son las sino-pales. Y en ambos casos es menester acudir con prontitud con la carcanilla, y aun bando la de dos, en dos horas, por q̃ es enfer-medad aguda y muy peligrosa, como q.do la calentura es gra-ve y la orina esta basada, color, y mas vi el pulso esta como tremulo, amenaza rapto ala cabeza, con q̃ se privan, y vuelen morir asi como sucedio, con mi Suegra, con Antolaria, y otras muchas de q̃ tengo esperiencia.

Quando en las pernicicosas, Viliosas, &.a ay signos de plenitud es menester dar vna sangria competente del braco, segun las fuerzas, y robustez del paciente.

Quando la orina esta turbia, muy encendida y quasi prieta en el principio, y conforme ba cediendo la enfermedad ba basan-do de color, hasta el Natural, es de buen pronostico, y al contrario malo. Y la orina muy encendida, y quasi prieta es propia delas intermitentes, aun en las pituitosas, de cuia especie son por lo comun las tercianas, y quartanas.

Aciendo mucha estitiques de vientre, con molestia del enfermo se echa una ayuda mulcebre de axinabe, cebada, dos hiemᵖ de huevo, y 3, y 4 onᶻ de Azucar, la qual tambiom se hecha en la pennicioja, q llaman vulgarmᵗᵉ a tabardilladas, en defecto de la ayuda de Calabaja, q en las dhas deve preferirse como mejor, y mas util: Esta se haje cosiendo una calabaja dulce a la qual se le saca la tripa, y se esprime, y este sumo caliente en el proporcionado calor para ayuda se echa, sin cosinanto, y sin sal, ni Azucar, ni otra cosa.

Lo he usado mᵘᵗᵒ fuios delos q llaman ordinarios, en las Iminas con solo uno, o dos vomitorios de Rayzilla, dandolo en una vez sin partirlo, en pezo de quatro, cinco, o seis tominᵖ quando mas, pues de cuatro para aniba, solo lo aguantan los estomagos delos negros, q son tan duros, como sus cavezas. Este es el metodo, o medicina con q los curo regulatarmᵗᵉ pues solo quando, no se les ha curado con el, q es el uso del methodo de las limonadas, he hechado mano de la carcanilla, y en los casos graves, q no admiten esperas, como queda ofrecido, por su agudeja.

Esto es lo q he podido decir en la brebedad de una carta, q si me fuviera llevado vmd. como le dije, quizas le ayudara siquiera de enfermero, o de serni voticario, o q.do no suplira la falta de mancha en la cosina, si aun fuera q.a ello. La son las dies, y no me ha quedado tpo para felicitar sus dias: hanlo q.e junto con la bienvenida, q no dudo lo recevireme con gusto, y q con ella no anticipara las gracias. Asi baesta sin cargo de respuesta, aun q no me salude si quiera q.e un parentesis; pero hizo bien. Y trayga tanto oro q es lo q conviene sin disputa, despues de la salud q pido a N. S. le conserve y q con ella mas D. g.to deseo, y puede, para q.e 77. vez. 7. sobre los 24, de Abril. a 19 de mayo, con q queda dha la ocupacion del dia. Del S. Ten.te se entretendra en contarle las novedades, q yo con todos los de esta su casa B. S. M.ˢ su Mayor Ser.te

Supla las menᵗᵉ

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

A un frasco de vino se le echa una
℔. de limalla de hierro, otra de Quina
mantjada y una quarta de canela,
se pone á fermentar p.r seis dias
teniendo cuydado de menearla ó bati-
rla, pasados hoc. dias se toma vn
rebolvenla una copita y se sale á ca-
minar.

De otro modo = Onza y media de
quina vien pulverizada, una onza de
limalla, media de canela, todo se echa
en una vacija y se le vá echando á po-
co á poco una almibar q.e se hará con tres libras
á q.e quede del color de triaca, q.e no que-
de muy espesa ni no chirle, se le ec-
ha dos cucharadas de vien vinagre y p.r
tres dias se rebuelve con una espate-
la y se pone al sol p.r poco tiempo. Se

toma la dosis, y se para con agua de Tonongil.

Otra

2 ß. limaduras.
1 ß. Canela.
1 ß. Cortezas de naranja.
1 ß. Anis, dos botellas

Rezeta de Lamedor de Naranja, p.ª la Tisica.

Se cosina una porcion de Agua de Chicoria, y un tanto de esta agua cosida, y otro tanto del Agrio de Naranja se hiene con la Azucar correspond.te y se le mezcla despues medio, ò un a.l de Ger, segun el Gusto del Enfermo; pero dho Ger ha de ser tolerable, sin olor, ni sabor alguno, p.ª q.e qualq.ª q.e haya er, sea Judicial.

De este Lamedor se tomaran dos Cucharadas p.ª la mañana, y encima un pozuelo de Agua cosida de Raiz de Perejil — Por Agua ordinaria se tomara hervida, introduciendo dos, ò tres veces un Trocito de Ruibarbo hasta que se tinte, y tome color — Es muy eficaz, y esperimentado.

Otra.

℥ j. de Cremor.
℥ j. de Ruibarbo —
℥ j. de Ger.
℥ j. Hª de Azucar.
℥ j. Hª Sumo de Naranja.
Raiz de Perejil, y
Chicoria —

Todo machacado en cantidad de 1½ — ordinaria de Cebada, y grama —

Quartillo de Agua hasta q.e quede en ½ quartillo — Agua

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

La Simaruba; se conoce en la botanica con el nombre
de quasia, tomado de Quasi nombre de un Negro q.e la
descubrio en Surinam: hay dos especie, quasia amarga
y quasia simaruba: es decandria monoginia, Linneo
syst. plant. El Diccion.o de Bomare abla de ella y de sus
propiedades. Quasi la aplicava p.a las calenturas ma-
lignas, en el Surinam. La raiz de este arbol, q.e es solo
la q.e se usa, es muy balsamica, y propia por su
amargura p.a resistir alos acidos, y ala putrefaccion
los dos principales destructores de los vegetales, y ani-
males. En la America la usan en las fiebres in-
termitentes, en las continuas, malignas, y putridas.
La toman en polvo, y con mas eficacia en decoccion.
Una ~~cuarta~~ ochava de esta raiz raspada, vasta p.a una libra
ò medio asumbre de vino: se usa tambien de la agua
en lugar de vino. Se usa de esta tintura en vino contra
la gotte, y p.a fortificar el estomago.

La quasia (dice Rieus.) ò Simaruba q ha-
bia crecido hasta ahora existir unicam.te en la Gua-
yana, se halla tambien en el Norte de este Reyno
p.r altiempo de subir el Rio Magdalena con el
Baron de Humboldt, la hemos encontrado inmedia-
ta à Badillos. Los Vecinos de allí ~~la~~ conocen
este arbol con el nombre de cauceta.

Las flores de la quasia estan dispuestas en ra-
cimos en la estremidad de las ramas, y son del tamaño
de las flores de la franciela: el caliz, es corto y de cinco
foliolas: los petalos son cinco: los estambres diez con anteras
oblongas y de posi- cion casi orizontal: semillas cinco
de figura oval- las ojas son pinnadas, en la amar
ga rematan en pa- en la simaruba en impar

Al Dr Dn Antonio de Arbo-
leda q̃ue Dios m. d.

en

S. Joan.

Yo le he suministrado en baño con todo acierto, sin q.e
temar haya producido accidente alguno aun à perso-
nas de constitucion delicada, y cuyo systhema nervio-
so era muy sensible. Me ha parecido que tomado
de esta suerte equivale à una friccion general, porque
para inmediatam.te alos vasos con el agua que le
mantiene circulen. Su efecto no se encamina à los
organos dela digestion, ni obra contra el estomago,
ni el pecho; pero no à todos conviene la misma dosis
de él, ni tampoco es siempre à las personas q.e pasen
con las mas robustas, à quienes deban darse las dosis
mas fuertes. Es prudente comenzar con medio grano
por cada media azumbre de agua, y examinar el efecto
que causa los primeros baños, y despues aumentar la
dosis à medida q.e se advierta q.e los efectos q.e produce
no son suficientes para destruir el galico. He tenido
enfermos à quienes he aumentado sucesivam.te la
dosis hasta diez y seis granos por cada azumbre de
agua, sin q.e esta cantidad de sublimado corrosivo
los perjudicase. Hacese tomar al enfermo media
azumbre de agua de tisana en el baño, ò de infusion
de malvavisco, ò de simiente de lino, en el espacio de
cerca de dos horas q.e debe mantenerse dentro del agua.
He observado q.e el sublimado corrosivo produce en
las personas de cutis delicado, una sarna de exethis-
mo, y muchos granillos q.e ocasionan comezon;
pero este inconveniente se remedia echando en el

agua del baño el cocimiento de una almorrada de linaza.

Administrado de este modo el sublimado corrosivo, facilita por lo comun las evacuaciones por camara, y orina. Tal vez suele dirigir su accion ala vegiga, ocasionando ardores de orina, pero estos duran poco. Todos estos accidentes se disipan con solo interrumpir este baño por un dia, y tomando en su lugar de agua purra. Este remedio obra leve[m]te en la boca, pero jamas produce salivacion alguna, pues solo trae q.[e] se hinchen las encias, y q.[e] haya en la boca un fuerte sabor metálico. Treinta dias de baños con el aumento dela dosis de sublimado á medida q.[e] se juzgaba necesario, bastaron para curar el gálico á los q.[e] yo asistí, sin necesidad de q.[e] tomasen interiorm.[te] mas remedio q.[e] el agua de cebada, de linaza, de malvavisco, ó suero. Algunos enfermos q.[e] no usaron de estas bebidas dulcificantes, sino de agua purra en su lugar, se hallaron igualmente bien.

Por lo demás no hay q.[e] esperar q.[e] este remedio cure todas las enfermedades venereas indistintam.[te], porq.[e] yo le propongo despues de esperimentado con buen exito, como un medio mas q.[e] puede añadirse á los diversos metodos empleados hasta aqui p.[a] curar el real veneno. Este metodo, ademas de no ser de modo alguno dañoso, es muy limpio, y muy cómodo. Como la orina descompone el sublimado corrosivo, debe prevenirse á los enfermos q.[e] no orinen en el baño.

Receta del Jarredon del P.e Salas: p.a Favores
Hoy, y otras Viernes. Quenca en la Cuna

Un poco de Cevada Vaynada, un Canuto de Cañafistola
la masada, un poco de Yerva de Castilla, una Rama
de borraja, y otra de Chulco, un poco de Culantrillo
una Rama de lechuga, un poquito de anis, todo junto
se cuese, despues bien cocido se cuela, despues de colado
sele hecha un poco de azucar, y se pone en punto
de Jarredon. En un Vaso de este Jarredon se haga
como dos Jicaras, sele hechan dos cucharadas de
cañafistola de Castilla, y el peso de 2 R.s de Vaibarbo
en polvo. Este vaso se divide en dos mitades de
Jarredon, la una de esta una Jicara se empieza
a tomar desde las cinco de la tarde, cada media
hora dos cucharad.s hasta q.e se acabe, y en esta
agua de Cevada; y la otra mitad se empieza a
tomar el dia siguiente a las cinco de la ma-
ñana, cada media hora dos cucharadas,
hasta q.e se acabe, y despues agua de Cevada

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Poderes de Leandro. 7 de Julho

N.º 3

Prouecara beber la mesma agua de fuente

Diariamte tomara en ayunas doce granos de sal amoniaco puro, quatro granos de azibar socotrino y todo junto se incorporara con vna, ó mas gotas de almidon de yuca, de modo q. se forme vna massa compacta y della se formaran dos ó tres píldoras las q. se doraran, ó platearan para tomarlas, embolbiendolas en vnas pedazos de Ostia humedecida con agua

En vna destas píldoras cada vez vendra diariamente vn polillo de sumo sacado, y clarificado en caldo de los nervios de gruma, y de toda la planta de cicuta, endulzando este sumo con vna cuchara da de miel de abejas.

Este sumo sin las píldoras lo tomará alas once del dia, y al anochecer.

Vsara muchas ensaladas de Verros, ó mastuerso, condimentada con Aceite vinagre sal &.

Si el parche del vando no hiziere progresos favorables, se pondra en su lugar otro grande de cubra toda la dureza de galbano, puesto derretido en vinagre de vino fuerte, y despues evaporado al fuego manso hasta q. tome consistencia de emplasto. El q. se renueba cada diez dias en vna badanita muy suave.

Yo tomara, leche, queso, mi manbeguilla

y hara mucho ejercicio ajice, durmiendo poco.

℞. Rad. Sars. Par. ℥j. Ligni
Guajac. Rad. Chin. ā ℥j Sal.
Sart. ℥j. Balliant. in aq. Com. ℔
VIII per dimidium horæ quadrantem
Remoscatur ab igne addendo Lign.
Sassafr. ℥j Fol. Capil. Ven. m/
Colatur et exsetur ad usum

Tisana antigalica —

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

N. 1

℞. Submuriat. Hydrarg. ʒij.
Confect. pilul. Hydrargir. ʒß
Extract. Colocynth. Comporit. ʒjß.
Ol. Cinnam gt. VIJ. M.
f. Pil. Dividend. in pilul. Q
Quinque. Capiat duas Mane
et Vesper.

N. 2°

℞. Unguent. Hydrarg. fort. ʒvj
Camphor. ʒvj. me d.
optime linantur. affricetur Tumor
Hepatis. portione parva, mane et Vesper

N. 3

Sulphat. Ferri ʒij. Sign n.° 6

Jarabe para curar el humor gálico

Media libra de sarsa sajada media libra de miel de abejas un puñado de bobaga otro puñado de sellagato de sepone en dos azumbres de agua por espacio de 24 horas despues se pone al fogon hasta que merme la mitad y despues se cuela y se buelbe a poner al fogon y se le echa libra y media de azucar y se le da punto ya que se beba del fogon se le echa una onsa de sen molido y media onsa de piedra zufre y esto se deja al sereno dos dias sino de la mañana y dias sin ca de la tarde se a se bien dias se ase que sea gas alaminar todo el tiempo de la dura ca mera carnes eca de enfermo por agua ordinaria toma sa de sarsa palo de la se hina y dos dias se toma el ja xabe y un dia las pildoras de mercurio asi se ba sigiendo hasta que se acabe el ja xabe

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

Receta para curar el humor galico

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTAMARIA

Tomese media libra de sarzaparrilla, y partida
en menudos pedasos, los pondras en doce
libras de agua bien caliente por espacio
de 24 horas, y en estado le agregaras un puña-
do de Palo de Vorraja, y otro tanto de Sen̄a, y
por falta de esta, agregaras otro poco de
borraja, y todo lo pondras a coser al fuego
hasta q.e mengue la mitad. Hecho esto se cuela,
y se guardan las yerbas y la sarza, y al
colado hecharas media libra de miel de
Abejas, y libra y media de azucar, y se
pone todo a hervir hasta q.e tome consis-
tencia de Jarabe, y entonces se separa del
fuego, y se le hecha una onza de polvos
de Sen̄a, y otra onza de polvos de anis, y
despues de frio se hecha en botellas de
vidrio, y se guarda para el uso.

Las yerbas, y sarza q.e se
quedaron, se hechan en una olla de
agua bastante grande, y se hacen
a cocer, y haviendo hervido un quarto

dona, se cuela y se guarda para bebida
por agua ordinaria.

Del sasave tomara por la
mañana dos onças y media, con un poco
de agua encima de la cocida, y a las
cinco de la tarde, o poco despues otras
dos onças y media, con otro poco de
la misma agua.

Si no bastare esta porcion
de sasave para la cura del Galico y
del Reumatismo Galico, se repite
otra dosis igual.

Si causare mucha evacuacion,
se suspende uno, o mas dias, y se buelbe a
continuar.

La comida que se le diere guando
pueda buenas. y permita la tierra
para q. beba asta agua de la cocida
q. es probechosa, y no tomará sercado
ni pescado, y tampoco dulce, ni api-
ni peras, y

Modo de hazer el Jarave de D.n Juan de Caranova; proprio para poner corriente el Regimen diario del Cuerpo.

Se ponen à cozer dos puños de la Yerba parieraria y hauiendo hervido bien, se saca la hoja, y en el agua se hecha una libra de pasas sin pepita, y se buelve à hervir; despues se cuela, y se le hecha la azucar correspondiente para hazer un Jarave; Estando este a medio punto, se le hechan dos onzas de Ruibarbo molido, y cernido, hasta q.e quede sutil, y sigue el hervor, hasta dejar el Jarave de punto.

Su uso

En medio Pozuelo de agua hervida con la Parieraria, ò solo comun, se hechan tres cucharadas del Jarave, y se toma al acostarse. Si à la mañana se hazen dos ò tres evacuaciones, se dexa pasar una noche, y la otra se repite; pero si no haze operacion se toma dos, ò tres noches seguidas.

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIUDAD DE NOMBRE DE DIOS Y STA. MARTA

a el ahogo

un puñad. de flor. de la santa. y de
ytra. q. pueden blancas y. en ese coim.
mb.r cinco dias, tres tarjas, clavel
y colond.; y con la correspond.te aman-
del xarave, y si fuere med.a botella,
one medio vaso de agua de cebada
viene menos, menos. La noche antes
pz usarla atom.te se le entregarà algo a-
siente el viento con un poco de aceyte de comer
suave. y se le pondrà una ayuda Romana.
Desp. de la misma agua santa. se le dara
un vaso de ella caliente p.a que sude y a la ma-
ñana dig.te, en ayun.o se le dara una cuchara del
agua de arave: otra a la noche. todo el tpo. q. es-
te tomando el Darave no se le permitirà q.
tome agua fria, ni leche ni fruta: se le
guardarà de aire, de aguaceros, y de sereno, tenien-
do el pecho abrigado, y sanarà perfectam.te

ARCHIVO HISTÓRICO
CUBANO NORMATIVO SANTA MARÍA
La Sabana

℞ aqu. Melliss Simplicis
℥j, Naphæ ℥ß
Aceti, citri ℥ß, Liquor
Mineral, anodin, offman
℥j, aqu. Cinnamomi
Cordeati ℥ij Sirup. esc
Cort. citri ℥ß. m. f. Lane

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Salamanca
CIPRIANO RODRIGUEZ SAN MIGUEL

Dn
D. Antº Lopez de Leon, de 65 años de edad, Cura de la
Yglesia Parroquial de Churriana, quien por tiempo de mas de 15 años
arrojaba con frequencia piedras de diferentes volumen, y figu-
ra, que motivan orinas ensangrentada, y otros accidentes
propios de aquel mal: á fines de Noviembre de 1800. padeció
retencion total de orina con dolor agudisimo, y gran in-
quietud. Vino a su socorro D. Bartolomé Rodriguez, Ciru-
jano en la Ciudad de Málaga, distante legua y media aquel-
la Yglesia. Habiendo precedido los remedios conocidos para
este caso, consiguió que con la aplicacion de la son-
da de plata arrojase el enfermo 7 quartillo de orina mezclada
con porciones de sangre. Se mitigaron los sintomas, y la al-
calia permaneció puesta, inyectando por ella un cocimien-
to de malbas y cebada. El 9 Dias quito aquella canula, y
aplico otra de goma elastica, introduciendo por esta una
injectura compuesta de media onza de xabon blanco disuel-
to en dos de espiritu de Vino, una de aceyte de limon, y me-
dio quartillo del citado cocimiento. Cada 12 horas cuidaba de
dar algunos ligeros golpes con la sonda de plata sobre
la piedra; hacia dos ó tres inyeccion, que se retenian al-
gunos minutos, y la elastica permanecia constantemente
puesta. Se tomaron alguna arena en la orina, aumen-
tó la cantidad del dado hasta dos onzas, y al octavo dia se
advirtió gran porcion de un barro sumamente pegajoso,
que detenido en el conducto de aquel instrumento impedia

que salieñ la orina: con este motivo mudó de camilas, siguiendo las inyecciones, y el agua de maiz por bebida. A los 20 dias desaparecieron las arenas, y las orinas se notaron cargadas de un cieno, ya cenizoso, ya blanco, con un olor notablemente desagradable. A los 40 dias salió la orina limpia, cesó el uso de aquellos remedios, y continuó el de la leche de burra, y baños. A los dos meses se presentó en la calle sin la menor indisposicion, bien nutrido, y capaz de cumplir con su ministerio, que ha servido hasta el presente. El facultativo propone esta observacion con el fin interesante de dar ocasion á los practicos para el uso de aquella combinacion, cuyo resultado que conocen lo instruidos y podria disolver, segun observado, las piedras de un volumen mayor que el que permite para su expulsion la uretra; consiguiendose por este medio la salida de aquellos materiales nocivos, y el gran beneficio de evitar en todos o los mas de estos casos una operacion, que es sanguienta y por lo menos y dolorosa. No dudo que por aquel remedio aplicado de los demas practicados se pueden substituir otros de igual eficacia; pero siendo el experimentado tan ventajoso, sencillo y facil, sin la menor incomodidad, parece inútil pensar por ahora en otras composiciones.

Methodo el mas eficaz q.e se ha encontrado p.a quitar las fiebres Rebeldes, como Quartanas, Cotidianas, y Tercianas antiguas como tambien las Tercianas q.e se han curado con el Metodo comun de la Carcanilla, y habiendose quitado repiten

Toma una onza de polvos mui utiles de Carcanilla media onza de polvos de Ruibarbo se mastuna mas bien, y se hacen de ello doce papeles

Dieta

No hade tomar el Cnf.mo p.r quatro dias, mas alim.to que Caldos de Gallina Pollo, ò Carnero, y de Xaia de Perexil, y Esparrago, o de Xaia de hinojo con una Xaia de Chicoria unos Garvanzos sal y avafar. Pero si no le bastaren los solos caldos podra tomar unas Sopas, y algun poco de Pollo cocido, q.e se puede echar en la misma Olla en lugar de Gallina El Agua q.e hade verter hade ser cocida con Xaia de hinojo de perexil, o Esparrago con una Xaia de Chicoria.

Deb.s doce papelitos se le daran uno en ayunas, otro alas once del dia, y otro alas 5 de la tarde, con un poco de agua de la q.e beve de ord.o p.r pasantes, y los otros nueve restantes se le daran con el mismo methodo en los 3 dias siguientes. Con esto se suspenden, y es mui raro el q.e falte.

Desp.s se buelben a preparar otros doce papelitos, y se le dan uno en ayunas, y otro alas 5 de la tarde con la misma agua y p.r q.e la combiene q.e tome alim.to se dispondrà q.e p.r tomar el papel de la tarde hayan pasado 5 horas de la comida, y se hade acabar tamb.n con este ultimo methodo los 12 pap.s ultimos.

Alg.s veces conviene q.e tome el Cnf.mo otros seis papelitos mas preparados con media onza de Carcanilla en polvo, y una ta. de polv.s de Ruibarbo q.e los iva tomando en 6 dias uno cada mañana en ayunas.

Si el Cnf.mo fuere debil, ò no fuere la enf.dad mui urg.te se pueden poner tres ochavas de Ruibarbo solam.te en lug.r de la media onza de cada cant.d q.e se preparò; y si fuere Niño o mui viejo se deberan minorar las cantidad.s de Ruibarbo, y Carcanilla a proporcion.

Añadiendo una ochava de sal de Ajenjos cada

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Salamanca

cantidad, q.e se prepara obra mas seguram.te y si hai obstruc-
cion en Vaso o hígado la remueve, y quita mas prontam.te
Quando hai la obstruccion se puede poner sobre un parche
de Emplastro de Melilloto ó de Cicuta con Amoniaco.
Si acaso alguna q.e sana mui sana usando el methodo
expresado volviese a repetir la fiebre, tomará cada quatro
horas un papel de los polvos siguientes con el cocim.to de la ra-
iz q.e se puesto para tomar la Manzanilla
Polvos bien sutiles de flor de Manzanilla un escrupu-
lo q.e es la tercera parte de una dracma, Sal de Agenjos
y Antimonio Diaphoretico mui medio escrupulo de ca-
da cosa; se mezclará mui bien, y sirve p.a una toma so-
la, y se ha de repetir cada quatro horas la misma com-
posicion como la dho. pero se ha de tener el cuidado de dar-
los quando este el enfermo sin la calentura.
Manteniendose el enfermo en cama, y particu-
larm.te en tiempo humedo evitará la recaida; p.q.e como
las fiebres intermitentes tienen un mal exito p.r una
supinacion ó sudor qualq.r viento humedo contrapa, y bol-
viendo el material a la masa es previsa la repeticion de
la fiebre.
Alg.s vez.s sucede q.e al tomar los enferm.s la ses.da do-
sis de un papel p.r la manzanilla, y otro ala Tarde les cau-
sa o nausea alteracion.s de vomito, ó dolor de estomago:
En este caso suele no ser necesario el q.e tome mas pa-
peles pero si hav.do sesado p.r 2 dias sintiese algun acre-
mo de repeticion, tomará uno solo p.r la mañana hasta
concluir toda la dosis ó porcion

Esta receta es p.a D. J. Jn.a
Y tambien le suele ser util la del Nitro del hosp.l
Inclusa, q tenia D. Juan Jose (de Dios gose) y se hace con
vinagre, y es util la en enferm.s y tambien la ay
sinthomatica, en otras enferm.s y mui freq.te m.te
en las intermitentes=

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

Don Hurtado

Bought of J. D. C. Alvarenga

1817
Nov.r 22.nd

1 lib.	Spiritus Trementina Rectificado		4
1/2 lb.	Tincture Cantharides	1.	4
1/2 lb.	Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce		6
1/2 lb.	Spiritus Volatilis Italicus	1.	—
4 oz.	Salis Volat Cornu Ceurbo	1	
1 oz.	Flores Zinci		4
2 oz.	Extracto Gentiane	1	4
1/2 lib.	Spiritus Volatilis Aromaticus	1	
		$ 7.	6

Rec.d Payment for J. D. C. Alvarenga

Jno. Bankworth

Don Huitado's

Sects.

Oliver Antonio Flores

Mi amigo

Embrocatio Stomachica.

℞. Ol. Succinorum ℥ij
Sp. Lavandulae Rectificat. ℥iv
Tinct. Castorei ℥iv
Liq. Ammon. Anisat. ℥iv

vel

℞. Sp. Lavandulae Th.
Liquor. Ammon. ℥ij
Sp. Ammon. Aromat. ℥i

Sp. Ammon. Aromat. ℥iv

Sig. n. f.

Sp. Ammon. Foetid. ℥iv

Sig. n. f.

Carbonat. Ammon. ℥iv

Sig. n. f.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CENTRO MONTEMARIA SANTA MARÍA

Pilulæ Oxy di Zinci

℞ Oxy di Zinci ʒij

Extracti Gentianæ ʒij

M. f. massa. Dividendæ in pilul.

N. cxx Capiat unam mane

et nocte. Augeatur quantitas

Oxy di Zinci ad gran. viginti

quotidie. —

Oxy di Zinci. ʒij Sig. m. p. —

Tabula regionis exhibet medica-

=mentum titulus proximus. —

Liquor Ammoniæ. – Titulus prior,
Spiritus Salis ammoniaci cum
calce. –

Spiritus Ammoniæ Aromaticus.
Tituli priores, Spiritus Volatilis
aromaticus. – Spiritus Volatilis
Oleosus. –

Spiritus Ammoniæ Fœtidus. Titulus
prior, Spiritus Volatilis fœtidus.

Carbonas Ammoniæ. Titulo
priores, Sal cornu cervi. – Sal
Volatilis Salis ammoniaci. –

Oxydum Zinci. – Titulus prior,
Flores Zinci. –

A. M. L.

19no Nov.is 1814. –

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana

ARCHIVO HISTÓRICO

Tomarán una naranja la mas agria, y madura, que haber se pueda, la que se partirá en tal disposicion, que sacada la medula, y lauada la cascara blanca de la cascara, ó tabaco assi bien dispuesta, guardado las porosidades exteriores llegue á distinguirse por lo interior, que es el caso en dispuesto á cantidad de tres onzas de vino blanco generoso, lo mejor que se encuentre, con cuyo licor ammasando echarán una á vez marcada hecha polvos, y como dos escrupulos de azafran, que bramtado todo, lo que estará en infusion en dicho vaso espacio de quinze y quatro horas, el que pondrás en una de aquellas vasijas por si se resudase alguna porcion: pasadas las quinze y quatro horas, tomarás un alfiler gordo, y con él picarás lo que se ponga en el vaso el bonado del vaso, para que por los picaduras poco á poco se vaya trascolando el licor, y luego que todo se haya trascolado, harás de dicha cantidad tres partes iguales, teniendo assimismo preuenido unas cañas entre verdes, y secas, las que enhormarán, y harás polvos, de los que, y dicho licor se una en la forma siguiente. Quatro, ó cinco dias antes de la Luna de ya se tomarán en tres dias continuados por la mañana las tres tomas, que refiere la receta, advirtiendo se hade echar en cada una al tiempo de tomarla, como una tomadura de tabaco de los polvos de las cañas, y que no se hade tomar en dos horas despues alimento, ó otra cosa: quatro, ó cinco dias antes de la Luna nueva siguiente se repetirán tomar en otros tres dias otras tres tomas del mismo orden, y tenor que las primeras; y quatro, ó cinco dias antes del llano de la Luna

ARCHIVO HISTÓRICO
La Salina
CIPRIANO RICARDO GUTIÉRREZ SANTA MARÍA

se volverán á tomar otras tres. con este orden se hará de modo
que el uso de este remedio, cuando el accidente, por su inten-
sion, ó continuacion en repetir, no infiriere urgencia especu-
liva peligrosa, que en este caso se mueva mejor reflexion, que
aquella que mas en prompto el informe pueda usar del re
medio, ó primeras tomas, observando para segundas, y tercera
el orden de guardar un mes para cuatro, ó cinco dias antes
del Llano de la Luna: ——

Emplasto

Sirve cura toda suerte de ulseras, inberveradas, ò viejas q.e sean. sin mas aplicac.n q.e dho Emplasto, p.a los Pechos q.e se abren, sin mas q.e todos los dias mudar un paxchez y si en donde se aplica la ulzera esta profunda, se puede hacer una puntica, à dho paxche, y minorarla todos los dias hastaq.e se llene, se cierre, y no poner otra cosa ni bañar la llaga.

Compocicion del Emplasto.

Se toman.n 3.. onzas de trementina fina de Abeto. se disuelve al fuego, hacer q.e yerva un poco q.e tome punto

Vease otras de Diqal ma Clarra, adaf

y luego se pondran + y veir adarmer de Emplasto de Centaurea, Diquelo este, se sacara del fuego; y al tiempo q.e tome punto ò consistencia se pondra una onza de minio hecho polvos sutiles, y tres yemas de huevos y se mezclara, y se bate bien, y en estando frio se hacen Magdaleones, ò Canutos como los de Cacre, y p.a el uso reg.r arte se mudan todos los dias los Paxches q.e deven ser de ancho de la ulzera.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Receta del Lamedor de las Sa[illegible] para
purgar bien, y tambien bueno pa[illegible]a las Al-
ferezes q no menstruan bien.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

En cantidad de un Frasco de Agua, se
hecha una mata de Guarca con raiz
de la de palo negro, q esté ya algo vieja,
dos, o tres, segn fueren de grandes, Cañu-
tos de Atracacha hechos pedacitos:
Uno, o dos, cañutos de Canafistola de
la delgada: Un puño de Culantrillo: Mas
dos raizes de Perejil, mas, ó menos, se-
gun fueren de grandes, o pequeñas; y de
estas sola la cascara de encima es-
la q se hecha. Cosido todo esto assa, q
esté tinto; se cuela, y se le hecha una
libra, o libra y media de Azucar blanca,
y se bá hirbiendo, y despues de haver
dado algunos herbores, cosa q no ha
tomado punto, se le hecha un poco de

la mejor, y mas dulce y sutil que, [illegible]
hubiere do lenzamente, y quitando la
la espuma, y fuere hechando. de le a
de a esto un Real, ô Real y medio de açucar
de Castilla; este se pica mui menudo con
unas Tixeras, y despues con agua tibia
se laba para quitarle el olzete, y se he
cha entre ellamedor, y se acaba de poner
en punto de Almibar gruesa, y lo podrán
tomar por la mañana en ayunas y
alas onze, y de noche, y en cama unos
tragos de agua de Culantrillo, o de otra
q[ue] heche de ver le haga mas proboch
a la persona q[ue] lo tomare.

Joannis Francisci Scardoni Rodigini. Aphorismi in Variolas.

ARCHIVO HISTORICO CIPRIANO RODRIGUEZ SANTAMARIA La Sabana

XII. Si pustulę seorsiũ exumpant, l. colabantur et introrsum reddeant cum pulsus debilitate ac refrigeratione, moderato instituto regimine detur infusum calidum thei forme, foliorum scabiosę cardui benedicti floxum sambuci chamomillę additis pulveribus ex corno Cervi filosofici pp. stibi diaphoretici ãa ʒj. Vesoar. Orientalis ʒj mẽ. f. pulv., & divide in part. iiij: addito syrup. Card. Sancti ʒß. mane et Vespere horis mediis: l. sequens Emulsio ℔. aq. flor. sambuci Ruthę caprazię (vulgò Asnayuio) cardui Sancti ãa ʒij. Semimis cardui benedict, aquileę ãa ʒjß. adde stib. Diaphor. ʒj. Sacar. perlati q. v. mẽ Capiat vt dixi.

XV. Fussi succurremus eclepmate ex oleo amygdalarum dulcium ad ʒij. syrup. violat. Calerti, et papaveris ãa ʒj. de quo sępiùs lambat ęgre. Adoni faucium, et laxymgis aq. floxum sambuci ad ʒvj. cum syrup. Diamoxorum ad ʒj. Aprhis mucilaginę seminum Cythoniorum. Adoni, suborig. oculorum connivetium eadę mucilaginę aq. flor. Rosar. et Samb. Ruthę, addito modico croci, et Camphorę.

XVII. Foveis in facie relictis sequens linimentum aplicetur. Axungię humanę ʒjß. Spermaceti ʒj. balsamę de copayba gt. X. cerę albę q. v. f. linimentu. Iisdem verò cicatrisatis aq. destil. flor. Tavarug. Rosar. Radic. Sigilli Salomon. faciei abluendæ.

Georgi Baglivi. Aphor. in Variolas.

Si circa 4. diem cum jam jam exumpunt Variolę capita impetum cum magno calore, anxietate, motibus tendinum, sub-saltoriis &c. statim impero cucurbitulas scarificatas, scapulis, et momento fere, facta quasi fuzentis sanguinis rebulcionę omnia prę Symphomata, velut in ovo suffocantur, et partim post felicitex exumpunt Variolę, ut plures vidimus.

Si sanguis ad caput impetum faciat, tensionesq. & in Hypocondriis adsint plantijs manuum, atq pedum spongiæ decoctis emolientibus tepidis, frigidulis apponi jubeo, magno cum syrtomatis levamine magna.

℞. Oleum amigdalar. dulc. ʒij. Sperm. Ceti. ʒiij. ol. rhodij gt. iiij. mẽ. f. unc. s. A. Ad foveas Variolar. delendas prestantissimum est remedium, dolorem lenit, acrimoniam tollit &c. ut notant etiam Doctissimus Mateus Anglię Archiater

Las Viruelas que vienen p.r el Equinopcio dela Primavera q.e es á 22. de Marzo ó inmediatas á él, son de mejor calidad, segun Observacion de los Practicos de Europa, y aqui se experimentó lo mismo en 746. Y las del Equinopcio de Octubre, ó inmediato á él, de mala Naturaleza, que tambien se experimentó aquí en 756.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIRILO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Discretas.

Empiezan con rigor y horror, que llaman Escalofrio.

Despues sucede intenso Calor,

Vehemente dolor de Cabeza y de Espaldas

Vomitucion, ó Vomitos.

Mucha propension al sudor en los adultos lo qual no se experimenta en los niños, ni antes, ni despues de la Erupcion

Si se aprieta á la boca del Estomago sienten dolor, y algunas veces de estomago y vientre sensible sin apretar con la mano

Estupor y sonno ó ancia, principalmente en los ninos.

Varias veces ocurren Accidentes Epilepticos, que llaman gota coral, ó mal de corazon, que si se experimentan en niños á quienes ya han salido los dientes, sospechan los Practicos con acierto de Viruelas en las Regiones donde son Epidemicas: Este Signo es por lo comun de muy buen pronostico, y que las Viruelas serán benignas & si dá este accidente por la tarde (como es regular) á la mañana se encuentran la Viruelas brotadas buenas y discretas &.

Alguna vez sucede, ó acontece en los que son de sangre laxa y facil que insensiblem.te y sin alguna especial incomodidad, ó sin accidentes mayores (como Vulgarm.te se dice) brotan alguna, ó algunas Viruelas benign.s que acaso no las sienten los pacientes, y de aqui viene el que estos tales dicen que solo llevaron los accidentes, si fueron sensibles; ó que aunq.e han criado entre Viruelas no les han dado, si acaso no sintieron los accidentes

Las Viruelas benignas distintas intenstinctas, discretas regulares, ó buenas, empiezan á salir dentro del 4.o dia (contando desde el Escalofrio, algunas veces mas tarde, y antes del dia 4.o rarissima vez, en cuyo tiempo se van disminuyendo los accidentes por lo comun, ó del todo se desvanecen, sino es que subsiste, ó permanece la propension delos adultos al sudor sin poderlo contener por muy poco que se cobijen, ó se abriguen, hasta el tiempo de madurar las Viruelas, que naturalmente cesa en este estado dela enfermedad, por si.

La Erupcion delas Viruelas discretas es en el modo siguiente Primeramente aparecen granillos, postillexas, ó chupitos semejantes en su tamaño á puntas de alfiler, medio calorradas Es-

parecidas primeram.te en la cara, cuello, y pecho, y despues por todo el cuerpo en las que se pegan ó contrahen por el contagio naturalm.te; porque en las que se inoculan, es muy regular que aparescan primero acia las partes immediatas á la incision

En este estado de la enfermedad sobreviene en muchos dolor á las fauces, ó garganta, que suele aumentarse conforme han creciendo las Viruelas.

Quando acaban de crecer las Viruelas, los intersticios, ó claros donde no las hay, se inflaman y ponen el cutis rojo.

Cerca del dia 8.º (contado desde el escalofrio) sobreviene nueva calentura p.a la supuracion, segun las Viruelas, mas ó menos, y es quando las partes intermedias que antes se mantenian en su color natural empiezan á ponerse coloradas, y hincharse mas ó menos, segun las Viruelas, con tencion del cutis, y dolor pungente, ó como Vulgarm.te se dice con el pellejo tirante, ó tieso, que aumentando se por horas, vá tambien aumentando la inflamacion, y tumor; de tal suerte que en el progreso de la Enfermedad, los parpados de los ojos se llenan é inflaman, ó hinchan, que pidan al enfermo de la Vista, asemejandose á una Vegiga soplada, y trampasente.

88

Sucede algunas veces que antes de este tiempo llega el enfermo á privarse de la Vista quando ocupa copia de Viruelas al blanco de los ojos.

Proximamente á la entumecencia de la cara, se empiezan á entumecer las manos, y dedos segun la copia de Viruelas, que sean pocas, es poca la hinchazon, y si muchas, mucha. Y lo mismo sucede, y se ha de entender en la cara.

Hasta este dia 8.º las Viruelas de la cara, que estaban suaves al tacto, y coloradas, se ponen asperas, y blanquisca poco á poco se llenan de un humor amarillozo: Entre tanto el tumor, ó inflamacion de cara y manos, que acabó de hinchar se mantiene en los intermedios de las Viruelas muy floxido, y rosado, semejante al color de las rosas.

Quanto mas benignas, y discretas son las Viruelas, tanto mas se asemejan al color amarillozo sobredicho, y el floxido, y rosado en los intermedios

Al contrario las Viruelas de las manos, y de lo demas del cuerpo tanto menos asperas y mas blancas se van poniendo, mientras mas van madurando, quanto las de la cara fueren mas asperas, y amarillozas.

Al dia 11.º se empieza á desinflamar la cara, y á secarse las Viruelas.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana

En esta especie de Viruelas se secan del todo dentro del 14.º ó 15.º dia; pero las de las manos, y de las demas partes del cuerpo permanecen blanquizcas por uno ó dos dias mas.

Las Viruelas de la cara y del cuerpo deponen escaras, que llaman descascaras; pero las de las manos perecen, ó se acaban largando la materia.

A las postillas del rostro sobrevienen unas escamas, ó cascazillas como afrecho, que son las que ocasionan los oyos, ó cacazamaduras subcediendo unas, y otras á las que cayeron, porque quando caen las primeras postillas, ó cascaras no se experimenta desigualdad alguna en la Cutis.

En todo el tiempo de esta enfermedad benigna se mantiene el enfermo estreñido, ó rara vez obran.

Estos son los accidentes, que ocurren en esta especie de Viruelas natural, y regularm.te por la misma propiedad, y naturaleza de la Enfermedad, quando por regimen contrario no se ha inventido el ord.º de ella; porque mal curada, ó tratada con regimen contrario al que requiere, produce accidentes anomalos, ó extraordinarios, que no sobrevendrian bien tratada.

Anomalia.

Primeram.te con la preocupacion vulgar, y perniciosa, de que conviene que quanto antes salgan las Viruelas, y que estas crezcan y se eleven, con muy fatal diligencia se abriga al enfermo en la cama, se le trata con regimen calido dandole sudores, ó alephcifarmacos, y besoaricos, con tanta mas exacta esperanza, y diligencia, quanto los adultos que en esta especie de Viruelas discretas tienen facilidad, y propension al sudor; sienten algun alivio sudando; pero despojados de este humor, ó sudor necesarissimo, para que se elevasen, y creciesen las Viruelas, y se hinchasen la cara, y manos (tan necesario esto como el que las Viruelas crezcan, y se eleven para el buen exito dela enfermedad) al dia 8.º que deve llenarse, ó inflamarse, ó hincharse la cara, queda esta por el contrario flacida, ó sin hinchazon se blancos los intersticios, ó claros, ó intermedios, aunque las Viruelas esten coloradas, y crezcan, aun hasta despues de la muerte del enfermo. El sudor que hasta este dia 8.º sin alguna diligencia manaba, ya por si solo subitamente se desvanece, sin que con remedios algunos cardiacos, que llaman sudorificos, ó con los mas calidos se pueda conseguir que el enfermo buelva á sudar. Sucetano le sobreviene delirio ó frenesi, anguscia, y congoxa vehementes, mea poco, y con frequencia, y dentro de pocas

horan, burla, ó engaña la esperanza, y acaba con la vida. Con este exrado methodo se trataban en Popayan las Viruelas, y con él mata-
ban tantos que arequnaban los vecinos ancianos de la mayor prdi-
bilidad, y verdad, que tenia á felicidad el quintar, y que de cinco enfer-
mos le escapasen los quatro: Bien notorio es aun que el Alfz D.D.
Jasinto de Mosquera tubo en un contagio 14. muertos en su casa,
por que los hizo unas camas forradas de Cueros de una curtiembre en
forma de carrancotes.

Se deve tener presente que quando las Viruelas son
pocas, el enfermo es anciano, ó se le ha sangrado en el principio, aquel
regimen calido, que hemos Rfexido, no es tan dañoso, que impedia si-
empre el que se hinche el rostro, y ocasione la muerte, &c. como quan-
do las Viruelas son muchas, el tiempo fuese caloroso, la edad del enfer-
mo floxida, ó robusta, y que no se le ha sangrado: Y el ver que al-
gunos enfermos salieron bien con el regimen calido, y sudores, man-
tenia la fatal preocupacion de que esto era favorable, quando es cierto
que la estacion humedad, y fria, la edad abansada, á quien naturalte
acompañan las mismas qualidades, ó las sangrias en el principio
libertaron al enfermo del perniciosso methodo con que lo trataron.

ARCHIVO HISTÓRICO
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA
Universidad de La Sabana

Confluentes Viloſo Alfombrilla.

Las Viruelas confluentes tienen los mismos Accidentes, ó sintomas que las discretas; pero mucho mas graves, y formidables: Esto es la fiebre, las ansias, la inquietud, el Vomito, dolor de Cabeza Espaldas, y rabadilla, de Vientre como colico, etc. por cuyos signos antes de la erupcion, ó de brotar, conoce el practico, que las Viruelas hande ser confluentes; pero en esta Especie no se observa aquella propension al sudor, que en las discretas, cuya grande propension al sudor denota que las Viruelas hande ser discretas, y no confluentes.

Muchas veces vienen catarros antes de brotar las Viruelas, y suelen durar uno, ó dos dias despues de brotadas, lo que no se experimenta en las discretas contrahidas en el modo ordinario por el contagio; pero se ha observado en esta de Tepajan en algunos á quienes se inocularon las Viruelas que antes de la erupcion tubieron algunos catarros, y las Viruelas fueron discretas. Estas Viruelas confluentes brotan por lo comun al 3º dia, y algunas veces antes (contando desde el Escalofrio) pero rarisima vez despues del tercero dia, y esto sucede quando algun grave sintoma de dolor de lomos semejante al reumatico, que llaman de riñones, ó al Costado semejante al pleuritico, ó á los miembros semejante al Reumatismo, ó al Estomago, y Vientre con grandes fatigas, y anguſtias, antes que broten las Viruelas, que en estos casos, como constreñidas, ó impedidas por la violencia de los accidentes se retardan hasta el 4º. ó 5º. dia; y en viendo estos accidentes mas graves que lo comun es fatal signo, de que hande ser confluentes, ó de bastante peligro; quando al contrario las discretas brotan en el mismo dia quarto inclusive (contando desde el escalofrio) ó despues; pero antes de estos terminos rarisima vez; y quando sucede el que broten antes del 4º. dia, suelen ser anomalas, ó negras, aunque discretas.

Quando estas Viruelas confluentes mas se adelantan del dia 4º. brotando el 1º. 2º. ó 3º. dia, tanto mas fatales son; ó quanto mas por la gravedad de los accidentes sobredichos se retardan del expresado dia 4º. en brotar.

Aunque en las Viruelas discretas cesa la fiebre, y los demas accidentes luego que brotan, dexando en serenidad al Enfermo, es muy al contrario en las confluentes, que asi la fiebre como los demas accidentes lo atormentan despues de haver brotado.

Estas confluentes brotan unas veces á manera de Erisipela, y otras de Sarampion ó como un sarpullido menudo, y en las partes de Europa, que son Epidemicas, y no de Contagio, como en esta parte de la America, se equivocan los Medicos, que no son bien practicos, cayendo Erisipelas ó Sarampion.

Creciendo la enfermedad, no crecen ni levantan como las Viruelas buenas ó discretas, principalm.te las del rostro, sino que uniendose primero entre si á manera de una Gelegia colorada que cubre todo el rostro, al qual hinchan antes de aquel tiempo, que lo suelen hinchar las discretas, ó buenas.

Despues à manera de pergamino blanco pegado al rostro que no se elevan mucho de la superficie del cutis natural: Pasado el dia 8. esta pelicula, ó pergamino blanco, poco à poco se bà volviendo aspera que se percive tocandolos con el dedo, y bà adquiriendo un colox oscuro, y no amarillo como en las diecretas. La aspereza, y el colox Oscuro se van aumentando hasta que esta pelicula, ó pergamino se bà cayendo à pedazos, ó laminas grandes, que Vulgarm.te llaman desollarse: Si la enfermedad fuera muy grave no acontece esto hasta el dia 20.

Quanto mas atroses fueren las Viruelas, tanto mas Oscuras, ó negras se ponen las Viruelas, quando van acercandose al maduxar, y tanto mas tarde se caen, sino muere antes el Enfermo, y al contrario, quanto menos confluentes, ó malas, tanto mas se inclinan al colox amarillo, y mas breve caen.

Cayendo todo este pellejo, ó cazacha no se encuentra desigualdad en el Cutis, pero despues sobrevienen escamas, ó afrechos de una naturaleza muy corrosiba, que no solo ocacionan ojos patentes, como suelen ocasionarlos las Viruelas diecretas, sino es que despexfeccionan el rostro con feos cicatrices; y si esta Especie hubiera sido muy grave, hasta de los hombros, y Espalda se cae el pellejo.

Se debe tener presente con mucho cuidado, que lo grave de esta Enfermedad no se hade regular por q.e haya muchas Viruelas en todo el cuerpo, sino es por las que existen en la cara, pues aunque en todo el cuerpo sean diecretas, si todo el rostro está cubierto de ellas, el mismo peligro tiene el Enfermo, que si todo el cuerpo Estubiera cundido. Y al contrario aunque mas espesas sean en todo el cuerpo, si en el rostro son diecretas, la enfermedad es mas benigna, y assi por el rostro se hade hacer juicio de la gravedad, ó benignidad de esta enfermedad.

En estas confluentes se obsevan mayores las Viruelas de manos, y pies; y quanto mas se bàn acercando estas partes al tronco del cuerpo, tanto mas pequeñas y contahidas son las Viruelas.

Dos accidentes mas dignos de obsevarse, y tenerse presentes, acompañan precisamente à las Viruelas Confluentes, que son la salivacion, ó babeo en los adultos, y la diarrea ó cursos de humor en los niños; aunque en estos ultimos suelen faltar los cursos algunas veces: Y tan necesarios en esta Especie de Viruelas, que por estas evacuaciones, del babeo en adultos, y de cursos en niños, se evacua la naturaleza, y se descarga del humor, assi como por las Viruelas, ó partillas gruesas, y el tumor, ó hinchazon de rostro, y manos.

Algunas veces empieza la salivacion, ó babeo al principio de brotar las Viruelas confluentes, otras al segundo, ó tercero dia, contando desde la erupcion. La saliva ó baba al principio es delgada, y con facilidad la arroja el Enfermo hasta de noche en la cama, mojandola, assi como algunos q.e babean por haverles dado el mercurio; pero no huele tan mal.

Cerca del dia 7. se enpieza, ó espesa esta saliba, se pone sediento el enfermo, tose quando bebe arrojando la bebida por las naizes, y por lo comun cesa este babeo el dia 11.; aunque alguna vez, pero rara sucede, que despues de uno, ó dos dias buelva.

En este dia 11. empieza á deshacerse la hinchazon del rostro conforme ba cesando el babeo, y en su lugar se hinchan las manos, y pies, ó deben hincharse, si la enfermedad lleva su curso regular, y lo contrario es malsigno.

La diarrea en los niños no suele ocurrir tan temprano, como el babeo en los adultos; pero en qualquier tiempo que entre, sino se atasa antes prosigue por todos los terminos de la Enfermedad.

En una, y otra especie de Viruelas, discretas, y confluentes, desde que empiezan los accidentes hasta que acaban de brotar permanece la fiebre; la qual brotacion acabada, cesa hasta que empiezan á madurar, ó se remite solamente en las muy fatales.

En la especie mas grave padece el enfermo por las tardes, como un paroxismo, ó que se empeora, mortiandose, y aumentandose los accidentes mas funestos, como que le entra calentura, inquietud, ó desasosiego.

Estos son los accidentes, que ocurren en esta Especie de Viruelas, natural, y regularmente por la misma propriedad, y naturaleza dela Enfermedad; quando por regimen contrario no se ha invertido el orden de ella; por que mal curada, ó tratada con regimen contrario al que requiere produce accidentes anomalos, ó extraordinarios, que no sobrevendrian bien tratada.

Anomalia.

El dia 7. es quando mas peligran los enfermos de Viruelas confluentes, y mueren; por que en este dia cesa la salibacion, ó babeo, segun el orden regular de la enfermedad, por si sola, y la hinchazon del rostro empieza á remitirse, ó deshacerse; y si esta hinchazon tan necesaria, para que el Enfermo no muera no persiste por algun tiempo, y conforme se baya deshaciendo, se bayan hinchando mucho las manos, y tambien los pies es necesario que muera el enfermo, porque en tan grabisimo mal, la salibacion copiosa lo mantuvo con vida hasta el dia 7. y la hinchazon del rostro, y la de manos, y pies, que succeden quando aquella se ba deshinchando, son unos medios ó desahogos por donde la naturaleza precisamente se descarga, ó arroja del mucho material de Viruela con que está gravada.

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIRUANO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Methodo curativo de Viruelas.

Advertencia.

Conviene mucho en el principio del contagio de Viruelas observar la qualidad de ellas, teniendo presente, que las que comienzan por los meses de Febrero hasta Mayo y Junio, se experimentan regulares y mas benignas, que no necesitan de tantas evacuaciones de sangre, como las que vienen por los meses desde Octubre hasta Enero que es el peor tiempo del año, y quando vienen las irregulares, ó anomalas.

Distincion

1ª especie: Discretas

Seis especies de Viruelas se han observado en los tres contagios ultimos en esta Ciudad de Popayan, que el 1º empezó por Febrero de 1746: el 2º por los fines de Octubre de 1756: y el 3º por Septiembre de 1765. Las primeras que se llaman discretas son de un color rosado encendido, puntiagudas, y el Asiento ó Vasa ancha á la forma de pan de azucar, desunidas, y separadas entre si, y que conforme van creciendo van blanqueando: Estas son las que llaman buenas y empiezan á brotar al 4 dia, contando desde que acometieron los Accidentes

2ª especie Confluentes.

Particulares Confluentes de 3ª dia.

La 2ª especie, que brota menuda, y muy junta se divide en dos grados, el uno de particulares confluentes quando en la cara y Cabeza brotan muchas, y menudas, que se unen, y estienden como si fuese una sola Viruela; pero en lo demas del Cuerpo estan separadas, bien que algunas veces, y en particulares en los que tienen alguna infeccion en el cutis, como empeynes, caratè, cicatrices ó semejantes, suele ocurrir la Confluencia en las tales partes; pero esta no es de tanto riesgo como la confluencia de cara y Cabeza, por que la gravedad de la enfermedad se conoce por la Confluencia, que á estas dos ultimas partes ocurre: Esta especie brota al 3º dia por lo regular; y lo fuerte ó grave de los accidentes dan indicio antes de brotar que seran de esta Calidad, que es muy arriesgada, y mueren de ellos, muchos.

Confluentes generalmente ó en todo el Cuerpo: de 1º dia incurables, de 2º dificil.

El Otro grado es de Confluentes generalmente por todo el Cuerpo cara y Cabeza; estas suelen brotar el primero, segundo, ó tercero dia, y rarisimo escapa de ellas.

3ª especie: Anomalas discretas de 3º dia.

La 3ª especie es de Anomalas discretas, ó desunidas entre si, pero cuyo color es de un encarnado oscuro, ó como dicen de sangre de toro, aplastadas, y sin punta

ni regularidad, como las regulares discretas, porque unas son largas, y otras de varias figuras, y por lo comun con una punta negra en medio, que se sume para adentro quando van creciendo; en esta especie salen al tiempo de madurar, principalmente al tiempo de madurar en brazos, muslos, y piernas unas begigas llenas de agua, como las que se suelen experimentar en las que maduran; y esta especie es bien arriesgada, y la que vulgarmente se dice Viruelas negras; y brotan al 3°. dia.

4ª. Especie: Anomalas con petequias.

La 4ª. Especie es la misma que la 3ª. antecedente, pero que desde el principio aparecen las petequias al pecho, y cuello principalmente, y tambien en lo demas del cuerpo, sin descubrirse en la cara; aunque agravandose la enfermedad salen tambien en esta parte, y son muy semejantes á la picadura de pulga: Este sintoma, que es fatal, aparece desde los principios de los accidentes por disposicion adherente de algunos, y acrimonia inflamatoria del contagio, como sucedió en el del año de 1765; pero en otros muchos sobrevinieron del abrigo, y regimen caliente, pues en los quartos donde huvo fuego, ó que por su disposicion eran calientes sin remedio se experimentó que no tubiesen petequias, de que murieron, sino se quitó el fuego, y calor, y se les curó con regimen el mas atemperante, quando las manchas ó petequias todavia no estaban de color morado oscuro, ó negro: Esta especie es muy fatal, y pocos se les trata con el metodo sobredicho á tiempo, mueren al 7°. ú 8°. dia, echando sangre por boca, y narizes por curso, ú Orina, y algunas veces por todas estas partes, aumentandose el tamaño de las petequias, y poniendose muy negras: En los que fueron tratados con regimen caliente se observa que uno ó dos dias antes de morir se corrompieron exâlando un edor intolerable

5ª. Especie: Anomalas irregulares particularmente confluentes.

La 5ª. especie es la de anomalas irregulares y particulares confluentes, que por lo regular quasi toda la Viruela se buelve negra, y las Vegigas de agua ó suero son mas, que no en las discretas anomalas: Y en esta especie se experimentó en el expresado contagio del año de 765. que observandose discretas, y desunidas, aunque muchas, confluian, ó se unian al primero, ó segundo dia de madurar, y particularmente en la frente, entrecejo y narizes, ó general confluentes de la misma figura, y en unas, y otras sobresalen, desde que empieza la erupcion algunas Viruelas mucho mayores que las demas, y estas se buelven primero negras que las otras. Nacen ó brotan desde el primero al tercero dia de los accidentes, y son de las mas fatales, ó malignas de que murieron muchos en el contagio de 1765. á las quales acompañaban muy frequentemente las petequias.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana

Para la curacion delas Viruelas se hade procu-
rar en el modo poible la pieza ó quarto, que sea desaogado, y fresco, que
no lo caliente mucho el sol dandole de lleno; pero se hade poner la cama
del Enfermo donde no tenga correspondencia alguna de Viento de puerta
ó Ventana, aunque estas esten con antepuertas, ó bastidores, por que al
entrar ó salir por la puerta se mueve viento que dañe, ocasionando
Retroceso, en el principio del Accidente de las Viruelas, y postemas en
el tiempo que secan y descascaran, impidiendo el vapor que exhala por
los poros; y de estar mirando el resplandor delas Ventanas se les las-
tima la Vista, y provienen fluxiones, y nubes á los ojos.

En los seis dias primeros es en lorque consiste todo
el felis exito de la curacion de Viruelas; se hade procurar que el enfer-
mo no tenga abrigo alguno de lana, y el que se le pusiese hade
ser de lienso de algodon ó lino, segun estuviere acostumbrado, privando-
le de colchon, y almoada de lana por los expresados seis dias, que son
los de los accidentes, de erupcion, ó quando acaban de brotar todas las Virue-
las, procurando que las sabanas, ó ropa con que se cubriere no la suba mas
arriba de la cintura, y como una cosa muy necesaria se hade tener
grandissimo cuidado en que no se cubran la cabeza, cuello, ni pecho, particu-
larmente con rebozos, que por costumbre, y con el atuzdimiento de la fiebre
se embuelven la cabeza, cuello, y pecho, y aun descubriendo los pies, y piernas,
que son las partes que conviene se mantengan abrigadas, y calientes, pa-
ra atraer á estas partes inferiores la erupcion, por que en ellas no son
de tanto riesgo las Viruelas, como en la cabeza, y cara endonde natu-
ralmente ocurre el humor de las Viruelas, y son estas partes supe-
riores las que se hande tirar á liberar quanto se pueda, por que
por la copia, y calidad de Viruelas que salen en ellas se experimenta
la gravedad de la Enfermedad, como está dicho, y asi hande tener la
cabeza, cara, y cuello Enteramente descubierto. Por doctrina de Autor
Clasico, y para evitar las Viruelas que ocurren interam.te á la garganta
se aplicaron en la Epidemia (que fue de Rubiales) del año de 1746.
unas fasillas de Vaieta, de las quales se experimento grave daño, y
ninguna utilidad; y en las de 765. que fueron irregulares pesimas
se experimento grave daño hasta de tener los hombres el cuello de
la Camisa abotonado, y en las mugeres el Volante que se ponen por la
Cabeza, aunque muy delgado, y de los bordados, ó tiziellas de lana, q. acos-
tumbra la gente pobre á la parte superior de la Camisa. Los Sabe-
llones, y Toldillos no hicieron alteracion muy sensible en las Viruelas
de 746. á los que los acostumbraban, sino es algunos Afectos comatosos,
y rarissimo Frenitis, ó delirio; pero en las de 765. se experimento
corrocido daño, alterando, y encendiendo á los Enfermos, ocasionandoles
mayor copia de Viruelas, Petequias, y delirios, ó Frenitis, que los Afectos

camatozo y fueron muy pocos en esta Epidemia.

Para que las Viruelas broten no se necesita abrigo, ni ningunos q. las estimulen, porque basta el calor natural para actuar el humor, y separarlo por la cutis, que es la obra de la naturaleza, estimulada de la fiebre que se sucita; y antes se necesita apaciguar, ó atemperar ésta, quando se enciende mucho, ó por temperamento ardiente aire del Enfermo por la qualidad del contagio, por el calor del quarto, por el uso de bebidas espirituosas ó por la fatal costumbre de dar sudores en el principio de la Enfermedad porque encendiendose la sangre, y precipitando su movimiento asimila ó reduce mayor cantidad de humor que produce muchas Viruelas que son las que hacen la Enfermedad peligrosa, y disolviendose mas ó menos produce las petequias, flusos de sangre por Orina, Esputo, &c. siempre mortales.

Los pies se hande tener siempre calientes para derivar el humor á estas partes, como esta dicho; Para este efecto se experimentaron por mejores los paños de lienso de algodon calientes aplicados cuidadosamente por conservar mas el calor, que no las Vaietas, y cosas de lana.

Es conveniensimo, que el enfermo por los dichos seis primeros dias se levante de la cama, ó que á lo menos viendo esta grande, y capaz mude de sitio en ella frequentemente para que ventilandose el vapor ardiente no se encienda mas la fiebre. Infinitas veces, estando el enfermo en la cama como atuzdido, convulso, y temblando, por la tenacidad de los que no lo entienden, sacandolos de la cama se atemperaron, y aquietaron; y quando no alcanzó esta diligencia se consiguió con atemperar con limonada, ó puchuculada hecha en el agua de cebada, ó alguna emulsion, ú Orchata con algunos granos de nitro; y no pocas veces estando el enfermo frenetico, ó con loquera, como dicen, saliendo del quarto al Campado, se atemperó, y pacificó, sin retroceso de las Viruelas: como tambien muchos pasaron el tiempo de los accidentes, y brotacion al raso de los campos, ó calles, y llevaron buenas Viruelas, como sucedio en el contagio de 765. al negro Alonso Cocinero de los RR. PP. dela compañia que el dia 6. de Enero de 766. apaleó á la negra Capitana con el atrudimiento dela Calentura, estando en el tercero de los accidentes; y haciendo fuga se mantuvo en una Chamba hasta el dia 6º en la noche, que se presentó al R. P. R. completa ya la Erupcion de Viruelas regulares, y de las mas benignas viendo de temperamento robusto, y de 25. á 28. años. Notese que en esta Epidemia mejoró el contagio desde que entró el mes de Enero, y las Viruelas eran comunmente discretas, y regulares, lo que no se experimentó en los meses antecedentes. Esto se experimentó en la epidemia del año de 765.

Se debe tener presente que estas Observaciones son hechas en Popayan, y su temperam^to, que es continuamente templado sin alteracion

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana

sensible de frio ó calor, pero extremam.te humedo desde fines de Septiembre
hasta Mayo y Junio, aunque desde Enero en adelante se experimenta la Atmos-
fera menos pesada y humeda; Y en los meses de Julio, Agosto y parte de Junio
y de Septiembre quando corren Vientos Sures, y Lestes, demaciadam.te seco. En
el año de 765. fueron el Verano, y estos Vientos por mas tiempo que lo regular

En todas tres epidemias, se dió unicamente por alimento á los en-
fermos desde el principio de los accidentes inclusive un caldo, ó el
agua dela Cebada escorticada bien cocida, ó de la que llaman masamorra
de maiz, cuyo grano quebrantan y limpian de su pelicula dientamente,
y se cuece hasta que el grano esté muy blando, previniendo que no se le
eche legia, ni tallos de axiaca chas que suelen añadirle, ó de arroz
de castilla, ó una polenta, que llaman coladas, hecha con agua y azina,
ó maza, que hacen de los tres expresados granos en una consisten-
cia clara, sin azucar, quando los accidentes, edad, y temperamentos de-
mostraban la alteracion, ó disolucion grave dela sangre, y aun en estos
casos probaba bien el que á esta especie de alimento se le mesclase algun
poco de acido de limon, todo á fin de pacificar el hervor de la sangre
con lo xamoso musilaginoso de estos granos cereales, privandola de los azu-
fres alcalinos con que la espiritualizan, y fomentan los alimentos de carne
permitiendo (si se podian conseguir, y las apetecian los enfermos) algu-
nas manzanas asadas. En los enfermos de menos gravedad se les
permitió la mazamorra con el grano, ó los tres granos bien cocidos,
que tambien acostumbran, llamando al de Cebada hordeata, y al de arroz
mazamorra de Castilla, para diferenciarla dela del maiz. Es cierto que
muchos pacientes, y los asistentes no se sugetaban á esta dieta, y daban
sus caldos de pollo, gallina, ó carne, quando los enfermos eran de
temperam.to laxo, ó blando, en quienes esta enfermedad suele ser
benigna, no ocasionaron alteracion ó daño muy sensible; pero tambien
es cierto, que el uso de caldos, ó sopas, y otros alimentos de carne con que
abusaron, ocasionaron manifiestas desgracias, particularmente en los seis dias
primeros de los accidentes, y erupcion, produciendo mayor encendimiento
en la sangre, de que resultó mayor copia de Viruelas, fiemtis, y diarreas
ó disenterias, en este estado, y en el progreso de la enfermedad, y tam-
bien petequias, que no se pudieron corregir con este abuso. Quien qui-
siere influirse en los fundamentos, y autoridad de este methodo, re-
gistre con Cuidado á Thomas de Sydenham en sus observaciones
Epidemicas sobre fiebres, y Viruelas, y á Hermanno Boerhaave en sus
Instituciones Medicas, y en su practica sobre fiebres, y Viruelas: Cu-
ya legitima curacion consiste en mantener el tenor, ó movimiento de
la sangre en un medio proporcionado, que no se acelere demaciado q.
es lo mas frequente, ó que no se entorpezca, y debilite demaciado

como sucede algunas veces, aunque son infinitamente menos, que las que por juicio errado se aprehenden, quando se excedió en la evacuacion de sangre, y en la enfrigidacion, ó naturalmente en algun temperamento demaciado laxo, solicitando que no se asimile, ó trasmute mucho material del que la naturaleza acostumbra arrojar al cutis. en abcecillos, ó granos que llaman Viruelas, para desprenderse, ó deshacerse del humor extraño, ó contagio, que se introduxo en los liquidos, porque asimilandose mucho humor Varioloso, no puede la naturaleza actuarlo, y digerirlo, para separarlo en Viruelas que maduren, sequen, y se separen, quedando postrada, ó sofocada como lo demuestran los fatales accidentes que sobrevienen. Todo este metodo se dirige á que las Viruelas sean pocas, Regulares ó buenas.

El agua ordinaria se les administró en todas tres epidemias tibia desde el principio de los accidentes hasta el dia 11. inclusive, cocida con cebada Escarricada, ó mondada, previniendo que primero se imbiese con un poco de agua que se arrojase para evitar la acrimonia que pudiera inferir la pelicula interior, y despues que se cociese con otra agua para el uso hasta que reventase el grano.

Quando se observaba tos se mandó añadir al ultimo hervor un pedaso de Oxozus quebrantado. Y siempre se ordenó que bebiesen mucha, con buen suceso de los que asi lo practicaron: Pero á los niños de pecho no se les administró sino es el agua simple destemplada, á aquellos que acostumbraban darla; y la de Cebada se daba á las Madres, ó amas que los criaban; previniendoles se abstuviesen de alimentos acres, y usasen de leche, huebos, caldos sin aromaticos ni picantes, y la masamorra.

Al 6º dia por lo regular acaban de brotar las Viruelas, ó se completa la erupcion; Y asi en estos seis dias consiste la legitima curacion, y buen exito de la enfermedad de Viruelas, solicitando por todos los medios referidos, y otros, que se expresaran, que las Viruelas sean pocas ó ninguna. No es irregular el que se pase la Enfermedad de Viruelas sin que broten los granillos, ó apostemillas que llaman Viruelas, pues los que tienen experiencia saben que algunos han pasado con solos los accidentes sin brotar Viruela alguna, como lo observaron los celebres practicos Boerhave, y Sidenham, por que todo el riesgo está en que sean muchas, que entonces no puede la naturaleza arrojarlas perfectamente á la circunferencia del cuerpo en unos granos, ó apostemillas regulares derumidas, y disecotas, y produce la copia de Viruelas pequeñas, que confluyen, y llaman al fombalia.

Si el enfermo es adulto, ó que á lo menos passe de los diez años se le hade sangrar, y sacarle del brazo de ℥ á ℥ Onz. de sangre en los tres, ó quatro primeros dias. Una hora despues de la sangria conviene se le dé un ℈ de Hypepag. molida en 2. Onz. de agua de Llantren,

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana

ó quatro, ó cinco cucharadas del cocimiento del Clarten; y aguardando á que el Vomitorio haga su efecto con uno, ó dos Vomitos, se le dará despues mucha agua de Cebada, previniendo que conviene diluir, ó introducir en el cuerpo mucha de esta agua, para corregir la acrimonia del humor de las Viruelas. Si se retardare el Vomito mas de media hora, se dara el agua sin esperar el Vomito. En el primer contagio se vió por Vomitorio el taxt. emet: pero se observó que producia muchas veces el imperterrene Sinthoma de la micturicion que rarissima vez se experimento viando la raizilla, y por eso no se continuo el uso del tartaro.

Si el contagio fuese muy acre, y ardiente como el de el año de 65, ó el enfermo fuese de temperamento ardiente, y robusto, ó por el fremitus, sueño, ó affecto soporoso, é inquietud Accesido, convulsion, ó temblor, se conoce que esta muy alterado, es preciso añadir al cocimiento de la Cebada algun poco de agrio de limon real, y tambien el de la naranjilla que llaman puchuculo, sin ponerle dulce alguno.

Si el enfermo abundare de crudesas, que llaman empacho, ó de lombrices cucurbitinas que llaman de Azar, muy frequentes en esta tierra, es util Repetirle otra dosis, ó cantidad de los polvos de la rayzilla en la misma forma, y administradales la mucha agua que se ha dicho, y con los agrios, si fueren necesarios, pasada una hora, ó algo menos, que tomó la primera cantidad, se debe tener presente, que varias veces se observó (particularm.te en la epidemia de 765.) que varios de los que padecian Lombrices Vomitaban un humor como el del Chocolate, ó algo mas oscuro, y el mismo humor Expedian por el curso, sin que se experimentase de ello mal efecto sensible; pero quasi siempre fueron fatales las Viruelas de los que padecian las lombrices cucurbitinas dichas Azares.

En la Epidemia de 746. salieron muy bien los niños de 9 años para abaxo, particularmente los que se inoculaban las Viruelas, y casi lo mismo sucedió en el de 766; pero en el de 765. quasi siempre fue mal quando no se les sangró: Y asi fué preciso sangrar con atencion á la edad hasta á los de dos años, y á estos se les daba unos granos de la rayzilla, y mas frequentemente se les hizo beber mucha agua cocida con cebada, con agrio, y sin él, segun lo indicaban los accidentes.

En la epidemia de 746. se pacificaban los enfermos con la primera sangria, y en el de 66. fué necesario Repetirla otra vez que por lo comun se hacia del tovillo al brazo sangrado; pero en la epidemia de 765. fué necesario sangrar hasta 3.as vez á los mas de los Enfermos, y aun hasta á los Niños, haciendo las sangrias algo mas cortas que la primera; y haverlas omitido en muchos, fue causa de que la Enfermedad fuese mas grave, y frequentissimamente mortal;

Y assi para governar las sangrias se hade observar diligentem.te la naturaleza del contagio, la Estacion, temperamento del Enfermo, y synthomas, ú accidentes que aparecen; y assi los dictamenes de que se sangre una sola vez son generales, y de mucho perjuicio en la practica: como tambien la preocupacion de que no se hade sangrar, estando ya brotando las Viruelas por el rezelo de que se entren para dentro. Infinitas veces se sangró hasta en 5.° y 6.° dia haviendo brotado algunas Viruelas, y á veces quasi todas, quando antecedentem.te no havia sido sangrado el enfermo, ó quando aunque hubiese sido sangrado se considerava la necesidad de Repetirse por frenitis, affecto soporoso, ó demas synthomas Relacionados, sin haver experimentado Retroceso, ni mas efecto; y de no sangrarse en estos casos se experimentaron fatales consequencias.

Es muy preciso en los 6. primeros dias, que beba el enfermo mucha agua de cebada (siempre tibia) para meter humedad en el cuerpo, ó diluir; sola, en los niños que ya no maman, y en quienes no se experimentan los accidentes de frenitis, temblor, Sopor &c, ó con el agrio de limon, ó de Puchucululo sin azucar quando aparecen dhos accidentes: En los adultos se hace mas preciso que la beban en mayor cantidad: y con algun poco de mas agrio que debe ser hasta un grato sabor, y algo menos quando los accidentes no son tan graves.

Tambien son de grande utilidad en estos seis dias las emulsiones de semillas frias hechas en la misma agua de cebada, ú otra atemperante con el Nitro de XII. á XX. gr. ó menos segun la edad y grados de la Enfermedad; y se puede Repetir en cantidad de IV. onz.as mas ó menos segun la edad, y circunstancias cada tres ó quatro horas; y en este caso no cae bien el uso de los agrios en el agua de Cebada.

Quando con el methodo referido hasta aqui no cesan los synthomas fatales del frenitis, y Sopor, es preciso, que se apliquen al Enfermo á los pies, rodillas, muslos, é ingles unos paños de algodon (que se experimentaron mas aproposito para conservar el calor) empapados en el cocimiento Emoliente que trahe Thomas de Sidenham para la Erisipela, ó el que trahe Boerhave en Viruelas de que se han Repartido varias copias con los nombres que tienen las hierbas en el Pais. Estos paños se exprimen despues de empapados, para que no chorren, y se tiene gran cuidado de remudarlos quando se van enfriando, lo qual es de muchissima utilidad en estas circunstancias, y tambien si se ponen al pescueso, y debaxo de los sobacos, como el que los Enfermos los mantengan en las manos. Algunas veces se practicó meterles los Pies en algunos de los expresados cocim.tos y tambien las manos, con buen suceso; y siempre lo produxeron favorable en la genero de trabajo, que por la dureza callosa de pies, y manos

g

padecen gravissimos dolores en ellas y en ellos en todos los estados de la enfermedad. Jamas se vió de ayudas alterantes ó purgantes, por el recelo de no mover el viento, tan facil á despeñarse, como perjudicial en este accidente; y solo se usaron talqual vez, que se consideraron necesarias en este estado, ó con el fin de humedecer se administraron de solo el cocimiento emoliente referido de Boerhave, sin azucar, sal, miel, ni otra cosa irritante: Jaunque las mugeres por abuso general administraban sus ayudas alterantes, ningun buen efecto se experimentó que resultase de ello. Los sueños que sobrevinieron á muchos, y aun se continuaron por algunos dias mas del estado de la enfermedad, particularmente en la epidemia de 766, provenian de la acrimonia inflamatoria, ó malignidad del accidente, y cesaban sin otra diligencia que la del methodo comun que se ha referido en parte, y se referirá. Saliendo siempre mal el intento de atajarlos particularmente en los 6 dias primeros; y solo en algun. pocos de Vizcaias discretas, pasado el 6.º dia se percibió algun beneficio, dandoles en una taza de agua de cebada el cocimiento simple de cuerno de ciervo calcinado, y dos D. de Diascordio á los adultos, repitiendolo por mañana y noche mientras duró el sinthoma.

Ultimamente para corregir los fremitus, y tambien los afectos soporosos es el ultimo, y mas eficaz remedio el Laudano de Meconio, ó el Laudano liquido, que se debe ir graduando hasta llegar á la cantidad que el mismo efecto de cesar el accidente dá á conocer, que no hay necesidad de alzar la cantidad, ni de repetirla, dexando hueco, ó intermedio entre cada cantidad de dos horas, ó poco mas que es el tiempo que gasta este medicamento en hacer su efecto. A una muger del Capitan D. Jose Mosquera nombrada Faustina de D. á 60. años de Vizcaias inoculadas sobrevino al dia 4.º de accidente (por un volcadiente que daba á una Ventana con su barrido que estaba en frente de la Casa) un Sueño como el de una apoplegia completa; pero con unas convulciones como las de una fuerte Epilepcia siempre que se le movia para sentarla, en cuya postura no podia mantenerse sin arrimo que la sostuviese. Se le aplicaron con toda puntualidad los paños del cocimiento emoliente dia, y noche: no tomó otra cosa por tres dias que el agua de cebada con el agrio del Puchuculo, y muy corta cantidad de la colada de cebada con el mismo agrio; pero el accidente permaneció por tres dias, hasta que en el ultimo se le empezó á dar dos ℥ del Laudano de Meconio que se fue aumentando un Drachma cada vez con el dicho intermedio de dos horas, y hasta que (por ultima vez se le dieron 6 Drach.s ro se corrigio el sinthoma; y poniendose en acuerdo brotaron las Vizcaias no de las del mayor riesgo, y salió con felicidad.

Un Guarda mestizo nombrado Andres como de 28. Años en el Empedrado, en 7.º dia de unas Vizcaias grales confluentes

de las mas fatales padecio tal frenitis, que no era posible vsetarlo mucha personas, y no se havia confesado: Se le empezó á dar el Narave de Meconio de Sd. C. Drach. con los dhos intermedios; y asi que se le aumentó hasta nueve 3, se pacificó, y pudo hacer en su juicio las dilig.s de Xtiano. Este murio. Se han puesto estos dos casos para que sirban de Exemplo, pero con otros muchos produjo este methodo feliz Exito.

El Narave de Meconio, que se vió es el que se hace con el mismo Meconio, ú Opio, por falta de las Cabezas de Adormideras con que se hace el de Sydenham; y seis 3. ú Ochavas del que se vió tienen la misma fuerza del hecho con Cabezas de Adormideras, XVI. ó XVIIJ. Got. de Laud. liquid. tienen la misma fuerza que las seis 3. del Narave hecho con el Meconio, y que una Onza del hecho con Cabezas de Adormideras; pero en los recos, y de temperamento ardiente no conviene dar el Laud. liq. por que altera, y calienta mas: bien q. en los pituitosos hace el mismo efecto, que el Narave de Meconio administrado en el mismo methodo proporcionado á su fuerza.

En los niños rara vez se experimentan estos Sinthomas con la reveldia que en los adultos; pero en algunos pocos casos que se ofrecieron produxo buen efecto proporcionando la docis á la edad. Este es el methodo experimentado hasta ahora con una observacion la mas prolixa, y vigilante, aunque mas se declame contra él.

En los Niños es frequente que al tiempo de brotar les sobrevengan espantos, y convulciones, generales, ó particulares de algunos ú otros miembros, que llaman las mugeres alferecia, y mal de coraz.n En la epidemia de 746. se vieron algunos, en la de 766. huvo mas; pero en la de 765. apenas hubo niño aun hasta de 7. y 8. años, que no la padeciese. Y aunque los mas graves Autores refieren este Sinthoma como presagio de que por lo comun hande ser pocas, y diezmotan las Viruelas, y asi se experimentó en los dos primeros contagios, no fué tan favorable en el de 765. pues en bastantes confluyeron, y salieron acompañadas de petequias.

En los dos primeros contagios se puso á los Niños en la cama con el abrigo que trahan de sanos, dandoles unas gotas de Laud. liq. y. g. 4 got. á un niño de 3 años en una, ó dos cucharadas de cosim.to de bezoar, por no haver entonces Botica, que proveyese de aguas destiladas; pero haviendola en el año de 765. se les empezó á administrar la proporcionada docis del Narave de Meconio en media onza ó una del agua de leche alexiteria, poniendolos en la cama como en los antecedentes contagios, cuyo metodo probó malamente, y por ultimo la experiencia enseño, que con solo ponerlos en la cama con menos abrigo del que se les ponia de sanos, evitan-

dolez todo abrigo de lana ſalian meſſa, cuidando con eſmero, que no ſe les enfriasen los Oxitos, y mudandoles ropa caliente.

Del dia 7.° en adelante que ya está formada la enfermedad, y brotadas todas las Viruelas ſe debe quedar el Enfermo en la cama, ſin mas abrigo, que el que trahia de sano, pues aunque ſi ſe calienta mucho ſobrevienen frenitis, ó Sopor, ſe le descarga un poco de la ropa, y con el vso del Nazaval de Mecon. ó Laud. liquid. ſe corrigen estos ſintomas en este estado de la Enfermedad 8

Las petequias, que llaman marchas del tabardillo, no requieren diferente metodo, ó curacion, que el que ha expresado; pero en estos casos es menester, que totalmente ſe le quite todo abrigo de lana hasta que enteram.te desaparescan las petequias, por que el hervor, ó disolucion de la sangre que las causo ſe buelve á sucitar facilmente con el calor y abrigo y en particular con el de lana.

Si la Enfermedad que ſe formó fuere de las Viruelas benignas ſe le dara al Enfermo por alimento las masamorras, y coladas hasta el dia 11. inclusive, y por agua ordinaria la de Cebada ſin acidos, ó cocida con borraja, y amapola, ó la del tiempo, y siempre quebrantadas; pero como en esta especie sudan los Enfermos con mucha facilidad, es necesario cuide de no sudar por que el sudor hace falta para que llenen, y maduren bien las Viruelas; y ſi estas fuesen pocas no daña el que ſe estido ſe mantenga fuera de la cama, con tal que ſe guarde bien del viento especialmente humedo, que causa peligrosos apostemas y retrocesos del materia al Vapouro; y solo para darle alivio, y que las Viruelas maduren, y ſequen con mas brevedad ſe administrara 6 drachmas del Nazaval de Mecon. á las 5, ó 6. de la noche, ó quando convenga 16 got. de Laud. liq.to; y ſi las Viruelas son pocas basta que ſe dé en menor cantidad á proporcion: Y con esto ſe alivian del dolor de las Viruelas, y duermen de noche; pero á los niños no es necesario darles estos opiados por que sin ellos duermen bien. Y se hade continuar hasta que ſequen las Viruelas.

Desde el dia 12. en adelante ſe empieza á dar al Enfermo algunos caldos, y poco á poco ſe le bá introduciendo el alimento de carne. Esta especie es muy benigna, y aguarta, y lleva el que los Enfermos ſe excedan; pero algunas veces ſobrevienen fatales resultas. Desde dho dia 12.° pueden tomar algun dulce, ó agua de azucar los que las apetecen.

Si las Viruelas fuesen anomalas discretas conviene que tome el Enfermo por agua ordinaria dos tarros de leche, y uno de agua, y hande dar 4.. ó.. 5. hervores despues de mesclados procurando beber mucha, y siempre tibia, que con esto crecen admirablem.te las Viruelas desaparesciendo lo negro de ellas conforme han maduxando 8

y las Vexigas que las acompañan son menos, y no dexan las fatales llagas que acostumbran producir: El alimento debe ser el mismo q en las diexetas, y en una y otra especie, como en las demas, no hacen daño unas manzanas maduras asadas: La referida leche se hade usar en esta especie desde el dia 7.° inclusive hasta el dia 11.° inclusive, y del dia 12.° inclusive en adelante cocida con la borraja, y amapola hasta el fin dela Enfermedad, y desde dho dia 12.° se le darán sus caldos con algun poco de agrio de limon, ó algunas coladas ó masamorras de arroz de castilla con algun agrio, y asucar. En esta especie son mas necesarios los opiados, que en la antecedente hasta el dia 16.° ó 17.° que es quando suelen acabar de secar; pero en los niños no convienen dhos opiados. Desde el dia 12.° pueden tomar algun dulce.

Si con esta especie sobreviniesen petequias, se curan con el mismo metodo dela leche aguada, y los opiados en los adultos pero procurando cuidadosamente que el Enfermo no se abrigue, y particularmente con ninguna cosa delana, ni de dia, ni de noche hasta que desaparezcan todas las petequias, cuidando que no se meta candela en el quarto, ni cosa que pueda calentarlo, pues antes se hade desembarazar de las ropas ó cosas, que hubiere, á fin de que se mantenga fresco. Y no valio mal alguna ú otra vez que se usó el poner algunas ramas de arboles, para atemperar quartos, que por su situacion les daba mucho el sol, y eran calidos. Pero se debe tener presente que quando en estas especies son muchas las Viruelas, aunque se vean desunidas, ó distintas y separadas acontece que no alcanza la leche aguada, y es menester que en lugar de ella usen los Enfermos del agua de cebada con el agrio de limon, como se dirá en las Confluentes; y particularmente si continuan los cursos blancos, ó de sangre que suelen haver en los seis dias primeros, ó si viniesen estos al dia 7.° Algunas veces se experimentó en varios enfermos de esta clase que dandoles la leche aguada les venian cursos, que no cesaron con ningun remedio, hasta que se suspendió la leche, y se les dió el agua de cebada con el agrio de limon: tambien fué preciso usar las ayudas, y paños de leche con sal desde el dia 12.° en adelante como se dirá en las Confluentes

Si las Viruelas fuesen confluentes particulas, ó general, regulares, ó Anomalas, con petequias, ó sin ellas que son las especies mas fatales, y malignas segun sus grados, se hade procurar que el enfermo no sude, y el abrigo no sea de lana, y que el que tuviere sea muy ligero. El alimento hasta el dia 11.° debe ser el agua dela cebada ó cremor de la cebada solamente con agrio de limon, y sin ningun asucar: Se hade tomar mucha del agua de cebada destemplada, y con agrio de limon

Nal

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

real siempre algo mas fuerte en particular desde que empieza la fiebre supuratoria acia el dia Octavo, à las 9. ó 6.. de la tarde, se le hade dar precisamente todos los dias 6 drach.s del Narave de Meconio con unas ó dos cucharadas del agua de cebada con limon, para desleirlo hasta la Vispera del dia 11.º q. entonces, para prevenir la fatal crisis del dia 11.º se le hande dar 9 drach.s à las 9. de la tarde el dia 10.º Y el dia 11.º por la mañana se le hande dar seis 3, y à las 9. ó 6. de la tarde las nueve 3, ó el equivalente de Laud. Liq.do, y se hade proceder con este methodo hasta el fin de la enfer.d; pero à los niños no se les hande dar los opiados aunque tengan cursos, porque si se les atajan se mueren.

Desde el dia 12.º inclusive conviene que use ya de algun abrigo; y que por alimento empiece à tomar caldos de pollo con un poco de agua de limon y sal, que son contra la corrupcion, q.e use algun dulce, y aun el azucar en el agua ordinaria, que hade ser cocida con la borraja, y amapola: si lo apeteciere es muy provechoso que tome dos, ó tres veces al dia una cucharada cada vez, de malvacia ó Vino dulce, y à falta de él, de Vino de Brasil, que de ningun modo tenga pez: Para arrojar à la circunferencia del cuerpo la materia ó podre, que es la que irremisiblemente causa los fatales accidentes que se experimentan en este estado. A los pies, de forma que le cubra hasta los tovillos, se le hande repetir Vigilarte.m tres unos pannos de algodon empapados en leche caliente, à los quales se les esprimirá el comun cuidando de mudarlos antes que se acaben de enfriar, y la misma diligencia se hade practicar al rededor del cuello cogiendo todo el pescuezo y ingle, al rededor de las rodillas, y corbas, en las ingles y muslos. A las cinco de la mañana, y à las cinco de la tarde se le hade echar una ayuda del cocimiento emoliente de Boraxe sin aditamento alguno. Y la leche y ayudas se hande repetir desde el dia 12.º inclusive hasta que se vea el Enfermo fuera de riesgo.

En todas las especies se hade sangrar al Enfermo al 21.º ó 22.º y al siguiente dia se le hade purgar, ó con la pocion purgativa comun, con el mechoacan, y una quarta parte de cremor tartaro en cocimiento de borraja. la qual se hade repetir hasta 3.. ó 4.. veces, con uno ó dos dias de intermedio, con la cautela de que si el Enfermo tiene algunos signos de inflamacion à la garganta, narices, ú otra parte suele ser preciso repetir la sangria, y entonces bastan dos purgas, y à lo mas tres.

Symthomas.

Aunque los methodos que se han expuesto á p.a cada clase de Viruelas, y sus diferentes estados hacen mas benigna, y curable esta enfermedad, quando puntualmente, y sin faltar en nada se practican desde el principio, y p.r lo comun se consigue sacar al enfermo con felicidad; no sucede asi quando el Vixolento es bebedor de aguard.te y particularm.te si lo ha bebido con los accidentes, ó inmediato á ellos, pues ninguno escapa del accidente porque á estos sobreviene el fluxo de Sangre por Orina, y otras partes de q.e ninguno escapa, ó quando no venga el fluxo, se forma una Confluencia g.e neral incapaz de que la venza la naturaleza.

Con el beneficio de la ingexcion, ó inoculacion salieron bien en los tres contagios bastantes Indios y negros bebedores quando hubo el cuidado de abstenerlos, y guardarlos de que no bebiesen el aguardiente, ni otro licor espirituoso desde que los ingixieron, y algunos dias antes poniendolos en la Dieta de abstinencia de carne, y atemperante como se acostumbra; pero en algunos que no hubo este cuidado, nada aprovecho tan poderoso, y esperimentado auxilio: Conviene poner á estos miserable en paraje donde no puedan beber licor alguno, por dos meses siquiera, y despues ingexirles las Viruelas, ó retirarlos á parte donde no puedan contraher la enfermedad, porque no hay probabilidad de que escapen de ella, sino es con la ingexcion, y cautelas que se han expresado.

Por no observar los methodos propuestos, y por infinidad de aplicaciones de que abunda la ignorancia, y capricho sobrevienen varios symthomas fatales, para los quales se pondran los remedios mas eficaces que se han esperimentado

Primeram.te si en las Viruelas discretas, particularmente quando estan son bastantes por regimen calido, y por haver hecho sudar demaciado al enfermo al dia 8.o no se inchase la cara, sino es que permanezca desinchada, y los intermedios de las Viruelas descolorido, y sin aquel color encarnado de rosa q.e corresponde; en este caso es necesario usar de regimen mas attemperante, y enfrenar ó apagar el vigasmo, ó hervor de la sangre dando al instante algun medicamento opiado, como el Narcotico de Meconio, ó Laud. liquid. que mitigue la desenfrenada ferocidad de la sangre, y concilie el sueño: con lo qual sosegada la naturaleza embia el calor y sangre á la cara para la circulacion, segun el orden natural que observaba en esta enfermedad, y como lo pide el orden de ella.

Quando este fatal symthoma ocasionado sobre el mal

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
ALCOMGUEZ SANTA MARÍA

regimen sobredicho se adelantó al grado de que el sudor (que por si, y naturalmente se experimenta en este genero diexeto en los adultos copioso) haya cesado voluntariamente en dho dia 8º. que el enfermo está molestado de fremitis, que se quexe de vehemente angustia, y que mee muy poco, y frequentemente, señales todas de estar proxima la muerte; y mas que es muy frequente quasi siempre el que en este caso acompañe copia de petequias de color fusco, ó negro. En este fatal caso no hay otro remedio que dar al enfermo repetidamente los Narcoticos, ó sangrarlo largo, sacandolo de la cama, y exponiendolo al viento, porque de no hacerlo asi muere en breve sino sobreviene un largo fluxo de narices. En este caso tan extremo no amenaza la muerte porque retroceden ó se entran las Viruelas, pues aun despues de la muerte se mantienen estas en todo su aumento con color muy encendido; sino es porque no se inchó la cara, como es preciso, y corresponde al estado, y naturaleza de la enfermedad; y assi p.a promover la hinchazon de la cara, y atemperar la sangre es necesaria la sangria, y moderada refrigeración, igualmte necesaria que el uso de los Paregoricos, que tambien se han de administrar.

Es el fremitis accidente muy frequente en las Viruelas, pero no en todo fremitis se ha de sangrar, sino en aquel que sobreviene en las Viruelas diexetas, quando son muchas, por no haverse hinchado la cara al dia 8º como corresponde, ó quando por el regimen muy calido, y por el uso de los cardiacos se tumultuado, y desenfrenado tanto la sangre que no dá treguas, para que con los medicamtos Paregoricos, y con los atemperantes pueda reducirse á la debida temperie, pues los fremitis ordin. se corrigen facilmte atemperando, y con los Narcoticos en la forma que está dicho.

El Segundo Hypocrates, fiel y diligente Observador de la Naturaleza, Thomas de Sydenham dice que muchas veces vió á Freneticos en tal agonia, á quienes libertó de la muerte, haciendolos sacar de la cama por algun poco de tiempo; y en las tres Epidemias que he visto en Popayan experimenté muchas veces lo mismo: Que muchos Frenesticos, descuidandose los asistentes, se salieron de la cama, á los Patios, á las Huertas, y á las calles desnudos, y algunas veces lloviendo, sin que de ello observase algun detrimento, ni de algunos que bebieron agua fria. En el frenetico está la sangre rarefacta, y encendida, y es necesaria grande infrigidacion, para que pare al extremo lentoroso daño en el Violento.

Suele suceder en las Viruelas confluentes, por haver precedido regimen calido, y tambien por el temperamento ardiente del

Enfermo, ó por ser bebedor de licores espirituosos, que la saliba que
babean en esta especie se ponga tan cruda viscida, ó quesea, (comunm.te
acia el dia 11.° de los accidentes en las confluentes regulares, y antes
ó despues en las anomalas, ó irregulares) que corre gran peligro el
enfermo de sofocarse, y morir en breve. En este peligroso caso es
necesario mandar, que diligentem.te por dia, y noche se le este echan-
do al enfermo con una escarpidilla continuamente una garganta de
agua de Cebada, y miel rosada, ó la siguiente: Corteza de olmo
seis drach.s (puede suplir por ella la corteza del arbol de aguacate)
de Orosús machacado media onza, Veinte paras quitadas las semillas,
y de sora lo que colan por dos veces tres dedos, que hierva todo en 36. onz.s
de agua hasta consumir la tercia parte del agua, que entonces se aparta
del fuego, y se cuela, y en lo colado se añaden dos onz.s de Oximiel simple,
y dos onzas de miel rosada, y mesclado todo sirve para la garganta. Pe-
ro si el enfermo fuese bien tractado una vez que empieza el babeo sigue
sus terminos con regularidad, completando su evacuacion favorable
sin necesidad de esta maniobra. Pero quando la cosa llega á tan
mal estado que por instantes peligra el enfermo de ser sofocado
cogido de un estupor, y quasi sin Espiritu, no es de confiar en solo
el garganismo, pues no obstante la sólicita aplicacion de él, mue-
ren muchos sofocados. Estando los Enfermos en este peligro so
lerado dice Thomas de Sidenham que no pocas veces administró
onza y media de Vino Emetico (que es un Vomitorio fuerte, y
en su lugar se puede dar otro de igual actividad) por que en la estupidez
que se hallan los enfermos, el Vomitorio mas cotto no operaria, y ex-
agitaria los humores que no podria probocar poniendo al Enfermo en el
mayor riesgo de la Vida. Pero con la ingenuidad que acostumbro con-
fiesa de buena fé que no se puede confiar bastantemente de este
remedio, y que para vencer esta atrocisima sintoma, que p.r si
mata á todos los enfermos de esta especie de Viruelas en el dia 11.°
se desea todavia otro mas seguro. No experimentamos en las tre-
pidemias el Vomitorio, por que infinidad de circunstancias no dieron
lugar á ello.

Quando sucede que al enfermo se le detiene la Orina con
solo levantarlo, y que dé uno ó dos paseos por el quarto, aunque sea
sosteniendo le otros, al punto mea con facilidad, sin necesidad de
diuretico.s

Asi como se precaven otros sintomas con el regimen a-
temperante, tambien se quita con dho Regimen el frenitis
que se ha dicho, nacido del demasiado escalentamiento del cerebro,

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad La Salamanca CIPRIANO RODRÍGUEZ

se cura ventilando, y atemperando la sangre lo necesario en el modo q.e se ha referido; y con este mismo methodo se cura el afecto comatoso, ó de sueño, aunque parece contrario al frenitis, y que pudiera dañar los opiados; pero es muy al contrario, porque con ellos se atemperan, y dispiertan.

Con esta misma atemperacion de la sangre se quitaron las petequias, ó manchas purpureas, ó moradas: Esto es en Viruelas discretas anomalas, no permitiendo al enfermo cosa alguna de lana en la cama hasta que desaparezcan enteramente, y dandole por aguada en la forma dha una mistura de una parte de leche, y tres de agua natural que hayan dado unos hervores despues de mesclada; pues la mistura de una parte de agua, y dos de leche no atempera tanto, como la de una de leche, y tres de agua, y de esta es mas seguro vsar en todas las Viruelas discretas irregulares, y anomalas, y por via de alimento la de una parte de agua y dos de leche viandola por una ó dos veces al dia solam.te; pero vi las Viruelas anomalas dhas fuesen muchas, ó de qualquier modo confluentes es preciso, que dexando la leche, use del agua de cebada con el agrio de limon, como está dho, porque la leche aguada no alcanza. Y dentro vsó de la cerveza tenue (que es lo mismo que el bocheto, ó cozimiento de Cebada mondada) con unas gotas de Espiritu de Vitriolo, hasta una grata acidez, ó agriolo en lugar del agrio de limon que acá hemos vsado para agua ordinaria, asi en las confluentes regulares como en las anomalas, ó irregulares. Y en la epidemia de los años de 1671. y 72. dice que despues de varias meditaciones le valió felizmente, administrando esta agua con el Espiritu de Vitriolo hasta el fin de la enfermedad, viendo q.e la leche aguada que havia producido felices sucesos en la de Viruelas anomalas de los antecedentes años de 670. 71. y 72. no alcanzaba en aquella ultima, y se morian muchos. Ricardo Morton que toda su practica la reduce á cardiacos, y Bezoardicos, confiesa ingenuamente que jamas pudo curar á ninguno de estas petequias, ó manchas purpureas, y que acaso solo se podian conseguir con el fuerte poderoso del Espiritu de Vitriolo, ó agua Estigia regia: pues que nada pudo conseguir con Vegigatorios, y con los mas generosos cardiacos para resucitar los Espiritus abatidos que se experimentan quando los Viruelentos padecen tambien petequias; y esto es lo que hacen acá los Chasras, que prueban primero con calientes, y quando les vá mal echan mano de lo frio contrario

La ultima epidemia que padecimos en el año passado

de 769. y estamos experimentando aun en Marzo de 766. es aun mas fatal que la ultima de 674. y 75. que refiere Sidenham. En las dos primeras no vsamos el vspiritu de Vitriolo, porque no lo hubo, vino es como una ó dos onzas, que se gastaron en el principio en curar llagas corrosivas de las mismas Viruelas, en las que es el unico Remedio, mesclado con miel rosada hasta una suficiente acidez; y en esta ultima Epidemia que hay alguno poco tampoco lo hemos vsado por los inconvenientes de mandarlo disponer en las casas, siendo imposible que se dispusiese para tantos en la vnica Botica que hay, y por ahorrar el corto á los miserables, que quasi las mas veces es preciso darles todo aun.o 8ª; pero la razon dicta, que prudentem.te administrado en el agua Ordinaria, con su poderosa virtud adstringente, y atemperante, sea mas util, y provechoso para atemperar y corregir la disolucion, y azidez de la sangre, y suspender las fatales diarreas, y disenterias que se experimentan, valiendo tambien laudable á algunos de potequias, á quien no alcanza el agrio de limon.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIRUJANO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Cocimiento para los Ojos.

Linaza y Ojas de malva de castilla, con agua de la tinaja, se hace cocimiento que quede algo baboso; en un poco de este cocimiento se echan unas ebras de azafran seco, que no tenga aceite de suerte que dè al cocimiento una color no muy encendida.

Si no hubiere el azafran seco, se seca entre unos papeles al sol, rcmudando los papeles hasta que esté seco.

Con un poco de este cocimiento tibio se lavan los ojos siempre que se necesitase quatro ó cinco veces al dia, ó mas si fuese menester.

Con el mismo cocimiento tibio se lavan las narices, y Oidos, si se criasen dentro Vizuelas, y hubiese necesidad de ello.

Gargara.

Cocimiento de Cebada mondada, y raiz de malvisco picada, al qual se añade un poco de miel rosada, ó de abejas herbida con un poco de rosa fresca, ó seca.

Cocimiento para las manchas, ó encomaduras de las Cirunas, ó Erygeiduras.

Raiz de Malvisco picada, y cebolla de Azuzena, de cada cosa dos onzas Ojas de malvas, flor de cranco, de Violetas, de Fiebol, y manzanilla de cada cosa un buen puñado, linaza una onza, que yerba todo en franco y medio de agua hasta consumir la tercia parte.

Con este cocimiento caliente se lavan las encomaduras, y manchas coloradas como Erisipela, y mancha de la ingexion quando vinieren, añadiendo onza y media de aguard.te á cada ocho onzas del cocim.to al tiempo del lavatorio.

En este mismo cocimiento caliente se meten los pies, y las manos, á los que les sobreviene frenesi ó locura despues de brotadas las Vizuelas, y se hade repetir tres ó quatro veces al dia, y sino basta esta es necesario dar al enfermo de doce á diez y ocho gotas de Laudano en cocimiento de lechugas, ó orchata de semillas. Lo mismo se hade practicar, si despues de brotadas las Vizuelas sobreviniese un gran sueño ó modorra, esto es el baño en pies y manos, y el Laudano, y en uno y otro caso es bueno desabrigar un poco al enfermo, quitandole las cobijas de lana por que uno y otro accidente son de calor

Esta misma diligencia se hade practicar con el mismo cocimiento quando les duele las plantas de los Pies, y de las manos metiendo los pies hasta los tovillos, y las manos hasta las munecas en dicho cocimiento calientico, ó bien tibio, con lo qual se quita, y alivia el dolor, y duermen.

Si en los quatro ó cinco dias primeros viniesen Vomitos que por lo comun es señal que las Viruelas han de ser dicretas ó buenas se le hace tomar al Enfermo mucha agua de cebada mondada, quitada el frio para que vomite bien.

Si con esto no se sosegase, y le sobreviniesen mucha ansias, ó temblor como escalofrio, entonces se le dará una bebida compuesta de la misma agua de cebada, y Pichuculos, que no esté muy agria, y sin asucar, lo qual tomará siempre que se halle fatigado.

Si no obstante esto permaneciesen los Vomitos se le daxan doce, ó cattorce gotas de Laudano en dos cucharadas de agua de hierbabuena, ó cocimiento á falta de la agua destilada

Si el vomito es poco ó moderado, y que no debilita las fuerzas se quita con solo Vomitar con el agua de cebada, y alguna ochata de la misma Cebada, que es el unico alimento que han de tomar aquellos á quien sobreviene Este Vomito, pero ha de ser sin asucar.

A los Niños de pecho, y hasta de tres y quatro años suele anteceder á la Erupcion, que es lo que llaman bayar las Viruelas, accidentes Epilecticos, que es lo que vulgarmente dicen mal de Corazon, ó gota coral, en que se tuercen, Voltean los ojos, y hacen otros genros Extravagantes.

Este Accidente es un signo ó señal de los mas alegres, y favorables que se pueden desear en el Accidente de Viruelas, y que quando alegra á los practicos entristese á las Madres demaciadas quexosas de sus hijos, y que no hay palabra con que convencerlas de lo favorable que es.

Luego que parece este accidente se pone al Niño en la Cama, y se le dá una Cucharada de cocimiento de Fosongil, y al dia siguiente aparecen las Viruelas discretas, y benignissimas, pero es bueno añadir á la Cucharada de la agua, ó cocimiento del Fosongil dos gotas de Laudano para el Niño de un año, tres p.s el de dos, y quatro para el de tres años

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

Agua para curar nubes, y otras carnosidades de los Ojos

Se toma el peso de dos ℔. de alumbre de Castilla; el peso de quatro reales de sal de Guayaquil, ó de la Mar, ocho cucharadas de agrio de lima madura, diez y seis cucharadas de agua del tiempo. Esto todo unido se cuela en un paño delgado despues de estar todo molido; y esta agua así colada se hecha con una plumita en los ojos del paciente.

De Scardon.

Secunda vel tertia die ante eruptionem, si febris fuerit vehemens, si vena turgida, si plenus halitus, aut si grave aliquod et lethale symptoma, aut febris gravis, et acuta undecima vel ultra die supervenientes, postulent, sanguis mittendus.

Potiones papaveracę tepidę, et copiosum propinatę in eruptione pustularum commodissimę; necnon syrupus de Meconio ab ʒ. ſ. ad ʒj. ſ. prout vel discretę fuerint, vel confluentes singulis noctibus exhibendę ad sedandum et si phrenitis urgeat, ut sumendum Emulsio Ventilophij adhibenda.

Decoct emol Vernavę

℞ flos malvę, althę taxaevaci vel dentis leon. vulgo Chicon. Verbaci. vulgo ojas de leche, lychnidis. vulgo alheli ää ʒʒ, faxinę lini ʒij aq. comm. ℔ij hasta la mitad.

De Sydenham.

Corticis arboris, vulgo aguacate ʒVj. Radicis Glycyrhiz ʒʒ. pasulaxum sine semine nr XX. Rosarum rubrar. pugil. ij. Coq. ad in aq. comm. ʒXXXVj. ad tert. part. consumpt. cui add. Oximel. simpl. et mel. rosat. ää. ʒij mę ſ. Gargarisma.

Ojas de malvas, malvisco, Chicoria, ojas de leche, alheli, de cada una media Onza, azitra de limaza dos reales, agua comun dos libras.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIRILIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CENTRO DE INVESTIGACIONES SALITA MARÍA

Es muy verosimil que el humor del herpes sea la causa de esta afeccion. Y la curacion debe dirijirse á remediar esta causa. Para hacerlo debidamente deberá comenzarse la curacion por el uso de los sueros bien clarificados, tomando un vaso regular de tres á ocho onzas de liquido á las diez del dia, y otro á las cinco de la tarde, echandole á cada porcion al tiempo de tomarlo una cucharada de miel de abejas. Debe de continuar por mucho tiempo, y para hacerlo con orden y sin tanta molestia, se dará principio á los sueros tres dias despues de la Conjuncion, siguiendo por nueve dias continuos: y por otros nueve en la menguante, contados tres dias despues de la Oposicion.

Asi seguirá por tres lunaciones.

El decimo dia en la menguante (despues del ultimo dia de sueros) se purgará con onza y media de sal de Inglaterra.

En todos los dias en que se deba tomar los sueros se bañara dentro de casa en tina entre onze y doze del dia, manteniendose en el baño por espacio de tres quartos de hora.

Concluida esta preparacion, se pondrá al uso de la zarza, y del aguardiente compuesto como se dirá despues.

Los Cocimientos diarios de la zarza se harán en esta forma. Dos libras de zarza se dividirán en manojos de dos onzas. Al medio dia se pondrá en infusion un manojo en doze tazas de agua y en una olla de barro vidriada. Asi se mantendrá por tres horas. A las tres de la tarde se pondrá á cocer á fuego manso asta el anochecer haciendo

q todo el Cocim.to quede reducido á quatro taza. Se colará, y tomará una taja bien caliente al anochecer, otra á la Die. dlla noche, otra al amanecer, y la ultima á las die. dl dia.

Por agua Ordinaria el segundo cocimiento de cada mano= Sto en diez y seis tazas de agua reducido á doze. Procu= rará beber abundantem.te

Asi rehacen todos los dias los dos cocim.tos y su distribu= cion asta completar los diez y seis dias.

La prepar.n dl aguardiente rehaia de este modo.

Se pesaran con prolixidad nueve granos de Soliman, y se mezclaran en el aguardiente de Cpaña en cantidad de una limeta. Alli se disuelve el soliman facilm.te y ya queda preparado.

Durante el uso dla zarza ha de tomar dos veces al dia una cucharada dl dicho aguardiente ante de tomar la taja de zarza á las hora señala, al amanecer y ano= checer.

Se mantendra en un Quarto bien abrigado para sudar abun= dantem.te Podra levantarse dl dia dos dl dia asta las Cinco dla tarde, y manteniendose con el abrigo corresp.te

En todo este tiempo el alimento principal ha de ser la leche de Vacas cocida con yerba buena, bebiendo de ella q.to quiera y pueda, especialm.te á las ocho de la mañana, al medio dia, y á las ocho dla noche. Bien puede migarla con pan. Si tiene dbilidad podra tomar el arroz cocido en caldo de buena sustancia, y

alguna vez al dia una presa de pollo ó de cordero asado. Se abstendra del dulce, y del Chocolate, y de todo otro alimento.

Concluidos los 16 dias al siguiente se purgará con onza y media de sal de Inglaterra, como se prescribió antes. En este y los siguientes cinco dias de descanso usará los alimentos de carne, abstenientose de la leche.

Este mismo orden se ha de seguir por otros dos tandadas asta completar seis libras de zarza.

Si se acabare el aguardiente se vuelve á preparar otra tinaja.

Si durante el uso del dho aguardiente apuntare algun dolor, lo q^e no es regular; se suspende el uso del aguardiente por tres ó quatro dias, y por consiguiente la zarza, para llevar ordenados los dias justos q^e se deben emplear.

Concluidos los terminos de la Curacion, no debe presentarse tan presto al aire. Deberá irlo executando poco á poco; evitando en los primeros dias de la salida los aires humedos, soles fuertes, y serenos.

Santafé 16 de Diciembre de 1783.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTANDER

Ingenio nostrum est vsu que paratæ magistro
Quod docuit natura ferax Ratione carentes. Nanciy. Lib 3

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO MUTIS Y SANTA MARTA

Es reflexion de Plinio, que la naturaleza ha sido mas liberal con los Brutos, que con los hombres; pues haviendo cuidado a aquellos naturalmente vestidos, y con suficiente sagacidad para defenderse de sus Enemigos, solo al hombre le destinó à la necesidad de adquirir todo à fuerza de Combinacion, y de trabajo.

Esta verdad comprovada con la Experiencia de todos los Siglos se hace mas sensible; quando contemplamos, q. à los Brutos en à quien debémos la mayor parte de los Remedios contra contrahemos mil. Veluis Las Pulgas, las Sanguijuelas, las Chinches, son Imbencion de los Animales asi como lo es el famoso curiatero, y percebatero de las Culebras que de poco tiempo à esta parte se ha divulgado en todo este Reyno.

Puesto el hombre en los Bayzes calientes, no está seguro de la mordedura de estos insectos, y mil vezes ha sido Victima de su veneno, mientras q. el Guaco un Pajaro del genero de las aguilas hace de ellos su Regalo, y Sustento principal. Los Negros de la Provincia del Chocó fueron los primeros segun se cree que observaron esta Ave, y q. conocieron la Planta de que se vale para adormecer, ò vea para enagenar las Culebras, y cogerlas sin Riesgo alguno

Esta planta ha dividido su Nombre de yerva, planta, ò Vejuco del Guaco. Su genero no está determinado en Botanica. Su Raiz es fibrosa, y se estiende en todos sentidos. El tallo trepador, ò Vejucano, es redondo quando joven, y de cinco angulos quando viejo, poblado de ojas opuestas acorazonadas, verdes entre mezcladas de morado, quando la planta es tierna, y de un verde obscuro, quando ha llegado à su perfecta sazon lisas por debajo, asperas por encima, y con Cabillos: sus flores colocadas en Cymeo, son amarillas Monopetalas con quatro flores en cada Caliz comun, ò Capullo. Dentro de la Corola entre rosa embudada, y de cinco hendeduras, se hallan cinco Estambres unidos por las antheras, ò bordillas en forma de Cilindro q. abrazan el pistilo, ò estilo del germen q. tiene el Estigma Escotado profundamente, y encierra varias semillas larguchas dotadas de un Vilano cenizo (*)

Haviendo estado en Mariquita en 1788. con el celebre Profesor D. Jose Mutis, quise Certificarme por mi mismo de lo q. me havian contado de la Planta de q. usan los Negros de aquellas Cercanias, y

Vbieran de la Magdalena para coger vivas las Culebras manejarlas, y llevarlas consigo sin experimentar daño alguno.

(*) Aunque la Lamina adjunta no representa la Anotomia de la Planta por hallarse sacado en tiempo que no tenia flor, ni fruto, con todo da una idea de un ramo joven de ella, segun el qual es facil conocerla donde quiera q. se halle (Esta Copia no lleva Lamina q. no hacerla puesto).

Destinamos para esta Operacion el 30. de Mayo, haciendo hecho venir desde la tarde antes à un Negro de S. Juan nuestro q. pasaba p. el mar Dulce en aquellas peligrosas experiencias. El Negro habia traido una Culebra ponzoñosa conocida en aquellos Contornos con el nombre de Jaya Coatic, à causa de las manchas blancas q. tiene sobre el Lomo y son algo semejantes à la letra X

Como hubiese visto al Negro tener entre sus manos la Culebra sin que manifestase deseos de morder, le hice varias cuestiones à cerca de la yerba de q. se valia, las circunst.s en q. lo hacia, y la generalidad con que obraba sobre toda especie de Animales ponzoñosos. Respondio con tal confianza, y de un modo tan ingenuo, que no puse duda en lo q. refiere, y por consig.te determine hacer yo mismo la prueba de aquel preservativo, sujetandome al metodo recivido entre aquellas Gentes q. poseen la misma virtud.

Este se reduce, à exprimir el Jugo de la yerba del Guaco, tomar una, ò dos Cucharadas de èl, y inocularse luego por la piel del mismo modo q. se practico con los Negros, con la diferencia de hacer seis incisiones una en cada pie entre los dedos, otra entre el Yndice, y el pulgar de cada mano, y las dos restantes sobre los dos lados del pecho. En saliendo sangre por estas pequeñas heridas se derrama encima un poco de aquel Jugo, y se frotan con la misma hoja, despues de lo qual, el sugeto se viste, y se sujeta a curarse, y en estado de coger las Culebras con la mano sin recelo de que le muerdan, ò si le hacen en sin actividad.

Esta Operacion, no solo se practicó con migo, sino tambien con varios otros Sugetos q. atraidos de la Novedad quisieron sujetarse à ella, y adquirir tan eminente virtud. De este numero fueron D. Juan Sarabia, Vecino de Honda, D.n Ignacio Calvimo Pbro. Xavier Mutis, un Page sillo mio, y otro Escolastico del S.r Mutis, q. apoyò mi Resolucion.

Para satisfacernos de un modo indubitable de la eficacia de la Yerba del Guaco, hicimos q. el mismo Negro trajese la Culebra que habia cogido el dia antes con el fin de hacer nosotros lo mismo, y habiendole hecho à asegurar del ningun Riesgo q. tenia en cogerla me atreví à ello el primero de todos los Curados. Inmediatam.te la Culebra se mantuvo entre mis manos sin poco inquieta, pero sin apariencias de morder. Perdí una vez el miedo, la bolvi à coger por dos veces en presencia del Presidente S.r Mutis, de D. Diego de Mendoza, q. es hoy

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS SANTIAGO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Canonigo de la Catedral de Cordova, de D. Marcelino Alvarez Bibliote-
cario q. fue de la Biblioteca R.l de Santafe, y de otras muchas Letter-
as asi de Cura del Universo Dr. Mutis como de fuera que se hallaron
presentes à la Novedad.

En Conseq. de lo q. me vieron hacer los otros Inoculados cogieron
ellos tambien la Culebra, la q. entrando en Colera por la mucha gente,
y movimiento favorable q. la hacian tomar, mordio por fin à D. Fran.co
Mutis en la mano derecha sacandole alguna sangre. Fue grande la
Consternacion, y todos Reclamon algun funesto accidente; pero el Negro
permanecia tranquilo, y aun el mismo mordido manifestava poca turba-
cion despues que aquel le hizo la herida con las Olas de la Yerba, y lo
asegurò de nuevo.

En efecto nada se siguio de aquella picada. Mutis se declarò im-
mediatamente con apetito, tomò todo el dia en su cocimio de Limon, durmiò
sin sentir la mas ligera Novedad: quedando todos enteram.te convencidos de
la bondad del Remedio, y deseosos de su propagacion en beneficio de la humanidad.

Confirmado pues en esta Experiencia en la Verdad de lo q. decia el Ne-
gro Curandero, le hice varias preguntas Relativas al conocim.to de Plantas
contra Culebras, y otros Secretos. Asegurome que la q. la presente era
la citada del Guaco llamada asi, por ser tradicion constante segn. se ha
dicho q. la comen estos Pajaros quando se sienten picados de alguna Culebra en
los debates, y aun otros que las dan à sus Pollos. Dio este es el nombre del Negro)
nos aseguro haver visto semejantes Combates, y el uso q. el Guaco hacia he-
cho de la yerba, q. es muy comun en los Montes de Ortaziguita, y en
todos los Cayos Calidos, y Temperados del Virreynato prevalece principalm.te
en las Quillas de los Arroyos, y Quebradas de estos Temperamentos.

Hecha una vez la Curacion en el modo q. se ha dicho debe continuarse
el uso de la yerba en todos los meses por espacio de quatro, ò cinco dias à
apto à coger las Culebras en todo tiempo.

Es verdad que yo no creo en la necesidad de semejante operacion, pues
estoy persuadido, à que la unica cosa que obra sobre las Culebras, y sus Venenos
es el olor que exala de sì la planta; cuio sumo continuado por algun tiempo
forma con la transpiracion una especie de Atmosphera q. rodea toda
la periferia de nro. Cuerpo, y atormenta, ò enagena la Culebra en terminos
de no desear morder, ò emboza su veneno caso q. le haga. Pero para
asegurarme mejor de un asunto de tanta Utilidad quise sugetarme
à la practica establecida, considerando no ser cosa de mal. molestia, y q.
no desaria de imaginar alguna Utilidad dentro del Cuerpo. asi como es Inegable
que se comunica el Veneno de la Culebra por toda la Massa de la Sangre
con solo la ligera Incision q. comunm.te se practica.

Por consiguiente tampoco creo será precisam.te necesario tomar la yerva en todas las menguantes de la Luna como quieren los Curanderos, y tomar
de q.e se pase la virtud de la Curacion. Juzgo mas bien que se podrá coger la
Culebra, y asegurarse de su mordedura siempre que antes de hacerla de
comer se tenga la precaucion de tomar la sopa de aquel pescado, no-
tando las manos con ella para mas seguridad.

No está decidido si el bapor de esta planta obra en fuerza del
fastidio que causa á las Culebras, como verdad.a y verdaderam.te anguilada, ó en
virtud de una sensacion agradable q.e las enagena, y hace olvidar su
natural ferocidad. Lo que yo he podido observar es q.e en asando encima
de las Cabezas de la Culebra la Saliva impregnada del sumo de la
planta se medio adormece por inquieta, y Colérica q.e este; pero cogiendo la
dicha que está curada manifiesta desazon, y deseos de huir: haciendo desapare-
do sobre la Cabeza de dos Culebras bastante cant.d de dho. Sumo, no observe
q.e se muriesen, ni manifestasen señales de mayor fastidio, pues de allí
á poco estaban tan ligeras como antes.

Sirve el Pescado del Guaco p.a todo genero de Culebras. Yo examine
á mas de la Faya de q.e he hablado, otra de la misma especie, una coral
(llamada así por su color encarnado) una verde en la Ciudad de Sinú
y Spñe. observé los mismos buenos efectos. Persuadome sea lo mismo de la Cas-
cabel, cuia especie jamas pude observar, bien q.e así el Negro Curandero
como otros muchos me aseguraron constantem.te la generalidad de la virtud
anguilada de esta planta.

No se vi exceda en esto mas. Pescado á la celebre Poligala
Senega de que nos enriqueció el S.r Linneo en una de sus disertaciones
Academicas. La Poligala Senega si solam.te Curaba de una determi-
nada especie de Culebras, qual es la Cascabel, y mas. Guaco es preser-
vativo, y Curativo de todas.

Para proceder á la Curacion de la mordedura de Culebras es
indispensable la ofa fresca del Pescado segun dicen los Curanderos;
hablo lo q.e ellos hablan sin resolverme ciegam.te á sus usos aunque
los tengo por ser practicas confirmadas por la experiencia. La practi-
ca es esprimir las ofas del Pescado, cuio Sumo mezclado con un poco de
agua tibia se suministra al enfermo en qualesq.r tiempo de la
enfermedad, y sino precede otra preparacion las ofas machacadas se
aplican sobre la herida, y si aun no ha ganado la hinchazon toda el
Cuerpo se ata el Pescado á aquella parte del que no ha ocupado la
qual cesa allí al instante, y el paciente se mesura sensiblem.te No
obstante esto siempre es menester continuar la misma bebida á lo
menos otras dos Vezes, en cuio tiempo ya puede el enfermo salir al
Campo, y compostarse como totalm.te sano, y libre.

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

Estan segura esta practica, q. en los Lugares donde hay Curanderas
Vaya vez, ó nunca muere ningun enfermo alguno de mordeduras de Culebras. Con-
vnadome que siendo este Remedio tan eficaz contra las culebras de America
vera tal vez un poderoso especifico contra la mordedura de la Vivora q.
cauza en Europa tantos estragos. Podriase hacer alguna experiencia, y
acreditada con un buen sucesso seria entonces la planta del Guaco muy bien
visto de Comercio para surtirse de las Boticas de allá. Y verdaderam. no
sera con poca llevar un socorro tan precioso á la humanidad, quan-
do se llevan tantos articulos de puro luxo. Los Ingleses del norte Ame-
ricano hacen un gran Comercio con la Raiz de la Poligana Senega de
Linneo q. ellos llaman Rattlesnake Root (*) Tambien tenemos nosotros
esta misma planta; y seria mucho q. valiendo de niña. indolencia se hi-
ciese asi de una, como de otra la debida exportacion á Europa, y se
vulgarizase en todo el mundo tan prodigiosa medicina? Seria á demas
no pequeña gloria de la Nacion hacer este servicio á la humanidad?

El metodo mas acertado de conducir á España, ó á otros Reynos
de America esta yerba en mi concepto en extracto baxo la forma
de Polvos, ó embotellado. De uno, ó otro modo seria muy facil practicable
por la mucha abundancia q. hay de ella en todos los distritos de esta
Provincia en Guaduas, y Honda, en cuyos dos ultimos Lugares la he hecho co-
nocer á muchos curiosos.

(*) Esta planta es la misma q. en las Cercanias de Santafe cono-
cen los Gentes del Campo con el Nombre de Yerba de flor morada, y en de-
terminadas Soconsa, y San Gil con el de Yagua, ó Yaguito. Un Botanico
Ingles que vivio muchos años en Virginia, viendo q. aquellos q. habian
sido mordidos por la Culebra Cascabel eran atormentados con Sinto-
mas semejantes á los de la pleuresia, y peripneumonia, esto es, difi-
cultad de respirar, tos, esputos de sangre coagulada, que tenian el pul-
so duro, y frecuente &c y q. se curaban con el uso de la Senega, ó Seneka
concluió que el mismo Remedio podria ser util en la pleuresia, y flusio-
nes de pecho, y con efto. ha sacado de la muerte á muchas personas
atacadas de estas enfermedades con solo el uso de esta planta vid. Essay
on the pleurisy, y la Medicina Domest. de Buchan en donde se halla
una Receta Senneka.

Talvez con el auxilio de una buena analisis quimica se halla-
rian en el Peru otras Yerbas igualm. Recomendables q. la q. conocemos.
Por de contado se puede conjeturar q. seria un vigoroso Remedio contra
las Lombrizes del Cuerpo humano, pues participando estas en cierto modo
de la naturaleza de las Culebras, no puede menos q. destruirlas, y

hacerlas anssi: el amargo tan intenso del Yesuco hace mas poderosa esta corteza, y penetrante tambien su virtud estomacal, y tonica de acuerdo q. quando han tomado de aquella planta se han sentido buenos efectos tomando, y no les ha hecho ninguna impresion nociva. Yo puedo asegurar de propria experiencia que teniendo un estomago debilisimo, jamas he tenido novedad quando he usado de este sumo.

Cria este mismo sitio el celebre Yesuco de Guayaquil q. hablan el C. Gumilla, y Nn. Jacquin con tanta admiracion, y casi en los mismos terminos que Yo. Este ultimo Autor dice haver conocido en Cartagena à un Negro q. le presentó una Culebra viva sin recivir daño alguno; pero por la descripcion q. hace de la planta dize q. se valia aquel, se viene en conocim.to de su diversidad respecto de la mia, que el Yesuco q. Jacquin llama Aristolochia anguinea, por otro nombre Cortiza Capitana, es el q. en tierra adentro conocen los Yndios con el de Yesuco de Caxare q. tambien ponen las mismas virtudes, aunq. no en grado tan eminente.

La Yecha, el Caxare, el Almirillo, y fruta del Guano q. todas son plantas del Suelo de Maniquita son tambien apropositos mas, ò menos activos para las mordeduras de Culebras, y de q. igualm.te se valen los Curanderos en los casos en q. falta el Guaco. Una de las medicinas mas celebradas, y de q. tengo una buena porcion, es la Corteza de Caxare. Cada dia de la humanidad, y conocim.to de todos doy aqui el modo de componerlas.

El Polvo. de la Composicion consiste en conseguir quatro Caxares de Culebras diferentes. Las mejores son Tayas, Caricas de Coral, y Culebras verde Mbelense juntas perfectam.te y en estando lo se mezclan con otra preparacion de sumo de Limon, nueve partes de Guano de Simiento, tres de Ajenjo, y Garbancillo (dos plantas muy conocidas en Maniquita) antes de la mezcla se muelen estos tres ultimos Ingredientes hasta reducirlos à polvo, en cuio estado se le echa el sumo de Limon en bastante cant.d para unirlo intimam.te las dos Composiciones se previenen de una Calumna con la q. la buelven, y rebuelven hasta que esten bien penetradas, y entonces las dejan secar p.a guardar el todo entre ojas de Tabaco, à fin de que no se acabe.

Este Remedio jamas se aplica sino como topico sobre la mordedura. El modo de hacer la Curacion es este. Luego q. el Paciente comienza à sentir dolor se le suministran los polvos de la Aristolochia anguinea, ò Caxare en Aguardt.e Vino, ò agua tibia. Procede se à hacer una incision en Cruz sobre la herida, encima de la qual se aplica la Corteza de Caxare molida antes en Metate, ò piedra limpia, y humedecida

con vsumo de limon.

Para quitar la hinchazon q. vsuele sobrevenir como efecto de la mordedura hacen aquellas Gentes dar Baños en las partes hinchadas con el cocimiento de vna planta vesicoria llamada vulgarm.te Chocasito que no es otra cosa q. vna especie de Calabaza amarga.

Vltimamente me añadio q. iguatm.te se curan contra las Culebras aquellos Animales Domesticos que mas se estiman, y q. mas viven, valiendose aquellas sobredichas Gentes de estas precauciones p.r la abundancia q. hay en las Tierras calidas de aquellos insectos ponzoñosos contra los quales la Naturaleza siempre prouida y fecunda en Recursos, le suscita aun q. algunas vezes desconocidos hia esparcido con prodigalidad las plantas que viuen de antidoto. El Guaco es vna de las q. á cada paso se encuentran y aplicadas hay Autores en Ciudad caliente donde no se halle con maravillosa abundancia.

Si nota Joret vn insecto planticola = Quos metuat casus vitæ mortali [illegible]

ARCHIVO HISTÓRICO
Instituto de La Habana
CEMANO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Receta p.ª curar el carate

Antes de hacer la untura que se dirá abajo, se bañará y jabonará el cuerpo el enfermo, y p.ª hacerle la untura se examinará si es mucho ó poco el carate difundido p.º el cuerpo. En el primer caso y cuando la persona tiene un cutis grueso, se hechará el peso de un real de solimán á la mistura; y si el carate es poco, ó la persona fuese de cutis delgado se hechara solo el peso de medio r.l á la mistura. Esta se prepara en Zumo de limon sutil, ó de lima agria, ó de pencas de cabuya mexicana, el cual se hervirá un poco hasta que espese, y luego se mezcla con el solimán q.e fuere necesario segun queda advertido. Inmediatamte se hará la unccion al sol, y condida se embolberan los brazos y piernas con franelas, ó bayetas, y se acostará el enfermo en su cama—

El Agua ord.ª que tomará el enfermo será la de cocim.to de Zarza, y de la misma tomarán sudores p.º la noche y p.º la mañana en nueve dias continuos. Por un peso de igual de los dará de agua ord.ª un segundo cocim.to de la misma Zarza q.e se cocinó en los nueve dias anteriores, sin q.e sea necesario usar de nuevas raices— Si el enfermo se acostumbrase con estas tomas de Zarza, se suspenderá, y se le dará leche agriada p.ª refrescarlos, mas ó menos, segn. fuere el grado á q.e se hubiere escalentado—

Cumplidos estos 18 dias se le pondrán un par de Sabadinas de cocim.to de Bledo chi-

quito con sal y vinagre. ~~Al tercer dia, con consulta de médico se sangrará~~

y al sigte dia tomará una purga de jalapa en dosis proporcionada á la complexion y demas circunstancias del paciente — Al tercer dia y con consulta de médico se sangrará — Alos 8 dias sigtes se labara el cuerpo con cocimto de zumaque, cascara de roble, y naranja; y en seguida se mudará de limpio, tanto la ropa del cuerpo como los fundas de la cama; y todo se hervirá en agua, despues de haberlo labado — Al sigte dia se volverá á untar el cuerpo á la sombra con la ~~mitad de la dosis~~ unza que se aplica en la primera uncion, al menos que no manifestare ceder el caracte, en cuyo caso se repetirá igual dosis á la primera — Al tercer dia podrá levantarse de la cama —

* la cual solo llevara la mitad de la dosis de sublimani,

Desde el primer dia en que se recoje el enfermo á la cama despues de la uncion, empezará á contar el periodo de dieta, que será de dos meses en que no se mojará, ni saldrá al sereno, y de seis meses, en los cuales no se asoleará, ni tomará dulces, ni carne de puerco, ni otras cosas algo encomosas, ni se llegará á la candela

En los 8 primeros dias tomará p.r alimentos carne asada, platanos verdes, y pan de trigo ó de maiz. Pasado este periodo puede tomar desde el dia de la purga comida de caldo —

Si con este regimen no se pierde el carate, es preciso repetirlo segunda vez en los mismos terminos

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CRISTÓBAL RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

Receta de Cesar Carate

El Jarave de balsamo se prepara tomando 2o onz. de agua, en la q.e se ponen tres quartas de Balsamo de Tolu, à fuego lento, hasta que mengue 8 onz. entonces se le hecha 1 lib.a de azucar blanco en polvo fino, y luego q.e se ha deshecho, se separa del fuego y se cuela. Para saber que ha menguado la dha cantidad se toma en la varilla, la medida haciendo una señal al nivel de las 12 onz. q.e se pueden echar p.r separado al efecto.

Para la apostema se le dan al Paciente p.r 8, ó 10 dias 2 cucharadas de mantequilla de baca fresca fundida, con una de miel de Abejas p.r la mañana, y 2 p.r la tarde ó p.r la noche, y sobre cada toma, un pugilo de agua de Calaguala. La manteg.a se mantiene sepe en agua, renudandola todos los dias p.a q.e no se rancie. Le suele mudar à la bebida un poco de Jarave de balsamo; pero no es nes.o y este se puede dar ó en su lugar la mixtura balsamica, despues de haber evacuado la apostema.

ARCHIVO HISTORICO
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTA MARIA
La Sabana

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIRILO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

Remedio Eficaz para La Tiña.

Dos honzas de Osas de Sem, dos Limones, y dos mansanas. El Sem, muy Limpio de los Palitos, y Los limones, y Mansanas hechas Quartos. Se pone el todo en infucion en Nueve quartillas de Agua sin fuego por tiempo de Beinte, y quatro horas.

Y se tomará el todo en tres Dias, a tres quartillos cada Dia, uno alas seis de la Mañana, a la hora de haverle tomado, se puede desayunar con Chocolate, ô sopas de el Puchero; alas Dies otro quartillo, Comer puchero asado, y alas sinco de la tarde otro quartillo, y su sena Regular de Puchero, se Repite esto mismo Los tres Dias.

Resta para Terciana.

Doze Onsas de Sumo de Naranjas agrias; Doze adarmes de Quina muy sutil molida; seis Onzas de Azucar blanca molida en polbo muy subtil.

Todo se mescla bien, y se hecha en una Botella, y entres mañanas seguidas se toma por tercias partes, bien entendido que no se hade hallar con el frio ni la Calentura el enfermo entomando lo.

Composision de Unguento Especial para Curar la Risa.

Fomese trementina de Venecia dos onzas, Goma de Limon Pura media onza Cera amarilla, y Pez griega, de Cada cosa dos Dragmas (que es la quarta parte de una Onza) estos simples se pondran en una Casuela, ô perol de Azofar, ya un fuego muy suave se derretiran, y Liquidos que yá esten, se les mesclaran de Polbos de minio muy sutiles, y sangre de Drago fina, de Cada uno una Dragma) que es la Octava parte de una onza) y assimismo polbos de axisto loquia Redonda, y mumia trans marina de Cada cosa un adarme, asivar Epatico empolbos, alumbre quemada, polbos de mirra de Cada cosa seis granos. todo esto se mesclará fuera del fuego meneandolo con una espatula, ô Cuchara continuamente hasta que este Cuasi frio, y assi se le añadirá, una Dragma de estaño que de Calamina en polbos, y otra Dragma de piedra magnetica arcenical preparada (que es la piedra Iman) y hecha la mision, se le añadirá un poco de balzamo negro que llaman peruviano quanto baste; de suerte que todo quede un emplasto, ô unguento suabe. Asi se guarda para su uso en una vasija vidriada, tapada con baldes para que no coja polbo; tambien se puede hasex en Canutos.

La Eficacia de este Onguento es para abrir la Risa, y serrarla, y supurarla, Curandola perfectamente con mucha Suavidad sin alteracion ni molestia en su Operacion, y su aplicacion es, Como se sigue.

Case un parchesito de tafetan negro en forma de media Luna, y con poco onguento se aplica sobre el Lacrimal del Oso, y de beinte y quatro en Beinte y quatro horas, ô algo mas, se Lebanta y enfuga la umedad que saca en un trapo, ô paño, y con suavidad tambien sin Restregar se enfuga La umedad, ô Materia de el Lacrimal, y se buelbe á poner el mismo parche, y el solo quando aunque tarde Beinte Dias, puede servir sin desvirtuarse, pero si por Antigua ô Rebelde tardáre mas en Curarse, No obstará otro hasta su Curacion. El parche, le podra traer algunos Dias despues de hecha La Curacion para mas bien asegurarse.

Tambien sirve para Granos Malignos, y tumores aung. sean Galicos de que ay esperiencia se há visto aplicár por un facultativo en un tumor maligno al pecho de una Nugez; y asimismo aun Niño Recien Capado, y aun abocado á Lamparones y sin mas que fletarle un poco con Saliva, y sál armoniaco dicho Lamparones, y ponerle un parche de el Referido onguento sima abrirlos Curado perfectamente. Sirve tambien para apostemas frias.

No se consultará para Usar de Ello con ningun facultativo por despreciar estos, todos los Remedios que no son dictados por ellos.

261

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIRILIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIRILIANO RODRIGUEZ SANTA MARIA

Receta contra la Ahogazon, ò Asma.

Se muele una Cabeza de Zebolla blanca suavem.te en un Almirez, echando al mismo tiempo, poco à poco Miel de Abejas hasta en Cantidad de una Jicara: despues de bien Molido, y desleido se pone en una Jazita de Loza, y se añade Media Jicara de Vinagre de Castilla bivo, y se Mezcla, y revuelve bien: en este estado se toma de Vato en Vato una Cuchara̅da como quien toma, ò chupa Caramelos; acavado q.e sea, se hace mas, hasta q.e expectore, ò desgarre bien, en cuyo Caso se purgara con dos ℈ de Maña desleida en una Jaza de agua tivia. La agua Salvania, ò à Vato, será de Zevada y Varizes de Grama, y de Chicoria; y será conveniente se de quatro baños de agua tivia desde las Vodillas, mediando de uno à otro, quatro dias, ò noches.

Receta p.a curar la torpeza dela Mano, y deder.

Sin necesidad de q.e preparativo, se puede Curar con dos ℈. de mana; pero será mejor el efecto asi de esta, como del Accidente, si p.r quatro, ò cinco dias antes, se toma̅ con Abundancia, y de Ordinario Agua de Chicoria, y doradilla; deste modo se aliviara la torpeza dela mano, y deos deder; pero sino fuere bastante lo dho, se Sobaran los deder, y mano p.r la noche con Aguard.te q.e tenga en infuccion un poco de Salvia; despues p.r unos dias se tendra puesto un guante.

Quatro onzas de Estiercol de Caballo fresco, y do-
ce onzas de Vnto vén sal, se mezclan; y se ponen hâ
hervir à fuego lento por un quarto de hora, meneando
la frequentemente con un palo: Despues se cuela,
y se exprime mui bien,

Este Vnguento se aplica con papeles de Es-
traza Calientico, en todas las partes quemadas; y
si son muchas se puede hacer doble Cantidad, ó mas
si fuere menester.

Se continua aplicando hasta q.e sanan las que
maduran; y es el Remedio mas eficas q.e hé experi-
mentado, en quantas Llagas de Vng.to hé experimentado
Azeites, y olios q.e se aplican.

Embio todo el Papel de Estraza q.e tenia
El Cocalotzio es para formarse las materias
que se hande limpiar suavem.te con unos trapitos.

Una vez que dice no siente nada interiormente puede Cucarpar.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIRILO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

1588
Leo. 22
07 32
12
63
289
63
222.
2
3
2
3

+

A Dn Jph. Hidalgo, de
Axacena. Que Dios m. a.
en

con 318 p. endobion de los viesos. Popayan

ARCHIVO HISTORICO Universidad de La Sabana CRISTINA RODRIGUEZ SANTA MARIA

METODO
GENERAL PARA CURAR LAS VIRUELAS.

LAS Viruelas, como todas las enfermedades acompañadas de calentura, se curan con mayor seguridad por medio de la misma naturaleza bien dirigida, y con el auxîlio de pocos medicamentos, y muy sencillos. Si en todas es malo amontonar remedios, en las Viruelas es pesimo. El vino, la triaca, los cordiales, las bebidas calidas, los sudores fuertes, el demasiado abrigo en la cama, el continuado encierro de la habitacion sin renovacion del ayre corrompido, y quanto se dirige á violentar la natulareza por el concepto errado de hacer brotar mas presto las Viruelas, han quitado la vida á millares de personas, que se hubieran salvado felizmente con caldos delgados, y agua tibia.

I....Si al sentirse acometido del mal huviese ansia de vomitar, beberà una buena porcion de agua tibia con sal, excitando la accion del vomito con unas plumas, ó los dedos, y ayudandose con mas agua tibia.

II....Se limpiarà el vientre con dos lavativas del cocimiento de malvas, y el de bledos en las tierras calientes, endulzado con la miel de cañas.

III....Despues beberà freqüentemente algunas tazas del cocimiento de borraja y amapolas, y de zebada en los Paises calientes, con un poco de azucar, tan caliente quanto se pueda sufrir; ò, como suele decirse, á soplo, y sorbo.

IV....Se mantendrá en la cama moderadamente abrigado, para entretener los blandos sudores, que sobrevienen en tal estado. No seria mucho que con esto solo quebrase la enfermedad, como sucede en algunos que solo pasan los primeros accidentes.

V....Si pasadas quarenta horas subsiste la calentura, hay fundamento bastante para creer que siga el mal. Entonces es necesario cortar el pelo, y dar un baño de pies con agua caliente por espacio de media hora. El baño se repite cada doce horas, hasta que apunten las primeras pintas: y es un remedio muy eficaz, no solo para disminuir el numero de las Viruelas en la cabeza, sino tambien para facilitar su erupcion en lo restante del cuerpo.

VI....Seguirà bebiendo abundantemente el mismo cocimiento; pero templado, y preparado cada frasco con una ochava del nitro purificado, y dos onzas de azucar.

VII....Alternarà las bebidas con el alimento reducido unicamente à las mazamorras de maiz, ó de arroz: privandose absolutamente de caldos; por estar ya bien averiguado, que los caldos, y quantas substancias provienen de las carnes son muy dañosas en esta enfermedad.

VIII...Es muy necesario contentar el paladar de los niños, y entretener la pena de los grandes, permitiendoles otras cosas, que no puedan serles nocivas. A este intento seles puede conceder el uso de las manzanas cocidas; qualesquiera frutas en dulce; las orchatas hechas en el cocimiento mencionado; la leche de bacas mezclada con igual porcion del cocimiento, y algunas rebanadas de pan; todo con el fin de hacerles olvidar el antojo, y natural costumbre al uso de las carnes.

IX....Brotadas las Viruelas, afloja la calentura; y en las de buena indole, ò poco numero cesa del todo. Conduce mucho mantener siempre libre el vientre; y esto se consigue sin irritacion, continuando cada noche las mismas lavativas.

X....La inflamacion que sobreviene à la garganta se va disipando con las gargaras freqüentes de agua mezclada con vinagre. Los ojos se bañarán á menudo con agua tibia.

XI....Ymporta mucho no mantener siempre tendidos, y abrigados en la cama á los enfermos. Despues de renovado el ayre de la sala ó aposento, que se consigue abriendo las ventanas por un quarto de hora, manteniendo entonces bien resguardada la cama del enfermo, se le hará sentar, y despues salir de la cama por algunas horas, con tal que este la habitacion bien defendida por medio de las vidrieras ó bastidores. Si la calentura es muy fuerte hay mas necesidad de sacar al enfermo de la cama por mas tiempo. Muchos admirarán este consejo; pero es el mas eficaz, y sin el son inutiles los demás. Sobre todo mucho aseo

y limpieza; y no permitir que se sofoque al enfermo con el demasiado abrigo, ni concurso de gentes.

XII....Quando comienzan á madurar las Viruelas sobreviene la segunda calentura; y este sin duda es el estado mas peligroso. Deberá continuarse con el mismo regimen y alimento. Puede abreviarse la supuracion y mitigar la irritacion untando las Viruelas con azeyte comun ò de almendras dulces dos veces al dia. Todos saben que importa mucho que los niños no se rasquen.

XIII....Estando ya bien maduras las Viruelas conviene abrirlas sucesivamente con tixeras muy puntiagudas, sin tocar en el fondo de la Viruela, que derrama la materia contenida oprimiendola suavemente con hilas; aplicando á menudo una esponja ò hilas mojadas en agua tibia para limpiar la podre, y evitar las costras que se formarían: repitiendo las mismas diligencias despues de algunas horas, porque las Viruelas vacías vuelven à llenarse à poco tiempo. El estado de abrirlas se conocerá por estas señales: quando estan del todo blancas: quando comienzan á amarillear, aúnque sea poco: y quando el circulito rojo de su circunferencia está del todo palido.

XIV....Quando comienzan à secar las Viruelas es necesario purgar al enfermo. La misma purga se debe repetir á los seis dias. Desde entonces beberá solamente del simple cocimiento de borraja, ó zebada.

XV....Pasada la purga ultima comenzará el uso de las carnes con bastante moderacion á los principios. El agua ordinaria será la natural con un pedazo de pan tostado.

XVI....Para acelerar la convalecencia tomará la leche de burras á la mañana; y en su defecto podran tomar los pobres la de cabras, ò la de baca aguada; y esto por espacio de veinte ò treinta dias.

XVII....La purga será compuesta de manna, sén, y un poco de anis en la suficiente cantidad del cocimiento de borraja ò zebada: proporcionando las cantidades desde una hasta tres onzas de manna; y desde media hasta dos ochavas del sèn, segun las edades. La escasez y subido precio de estos generos al presente pueden suplirse con la sal de Ynglaterra desde media hasta dos onzas.

Por mas benigna que sea la epidemia suelen ocurrir accidentes de mayor cuydado que el que parece anunciar una Rezeta general, acomodada á toda clase de gentes, y á los diversos temperamentos de todo este Reyno. Sin embargo conviene que este metodo se observe puntualmente, por que en ninguna especie de Viruelas podrá dañar, y siempre aprovechará para persuadir à las gentes que se abstengan de otros remedios peligrosos, y solo proporcionados á convertir las Viruelas de buenas en malas, y de malas en mortales. Hará muy bien de consultar al Medico quien pueda; y donde no haya este recurso se podran tomar algunas luces para los lances apurados en el capitulo de Viruelas del Sabio Tissot en su Libro *Aviso al Pueblo*: obra superior á todas las de esta clase, y que no puede leerse sin el debido reconocimiento á tan celebre Autor por su amor á la Humanidad.

Este metodo há probado bien en la Ciudad de Mexico en la epidemia de Viruelas que allí se experimentó el año de 1779. *Y haviendo causado ultimamente iguales buenos efectos en la Ciudad de Cartagena de Yndias, se remitió á esta Capital con el mismo fin, donde exáminado por el Doctor Don Josef Celestino Mutis lo há adaptado, y aumentado en varios puntos, conforme á los conocimientos practicos que tiene del Reyno.*

CON LICENCIA: en S.ta Fé de Bogotá: en la Ymprenta Real de D. Antonio Espinosa de los Monteros. Año 1782.

ARCHIVO HISTÓRICO La Merced

✠

EXPLICA[illegible]A DOSIS EN QUE SE DEBE USAR el Agua [illegible]ó Alkali volatil Saponaceo, que se despacha [illegible]Botica de D. Lorenzo Rodriguez, en l[illegible]za de San Antonio de Cadiz.

LA AGUA DE LUZ, ES UNA ESPECIE DE JABON VOLATIL EN LICÓR, cuyo olor es muy penetrante y fuerte.

Este licór está compuesto con el *Alkali volatil fluido*, y el aceyte de Sucino (ó sea de Ambar) ractifi[illegible]ado; de lo que resulta un color de leche.

Se puede usar interiormente sin ningun riesgo, con consulta de algun facultativo en los casos siguientes.

Desvanecimiento de cabeza: ya sea por vapores acidos del estomago, ya por alguna sofocacion, por exemplo, de las luces, del tufo del carbon, ó de algun gran concurso de personas, &c. Se ha de acercar al olfato, un frasquito destapado con suavidad, si fuese necesario, se acercará á la naríz lo mas que sea posible; pero si en alguno de estos casos huviese necesidad, se administrarà interiormente, desde diez á veinte gotas, en medio vaso de agua del tiempo.

Apoplexia: Luego que se reconozca este accidente, se le darán al enfermo, veinte, ó veinte y quatro gotas de *Agua de Luz* en medio vaso de agua del tiempo, y se repetirá la misma dosis otra vez, si no volbiese del accidente; continuando hasta la per[illegible]cion, dandole de quatro en quatro horas, de seis á ocho gotas, en un p[illegible]agua comun.

Sincopes, Insultos [illegible]osos è histericos: Se aplicarà al olfato, y si no volbiese, se mojarà una [illegible]da en la *Agua de Luz*, y se aplicarà al caño de la nariz y se usará interiorment[illegible]n dosis de quatro á ocho gotas en un poco de agua.

Mordedura de Vivo[illegible]: Se pondrán cabezales empapados sobre la herida con dicha *Agua de Luz*, y [illegible]bministrará al paciente, de ocho à doce gotas, de medio vaso de agua d[illegible]po, y ésto se continuará de quatro en quatro horas.

Picadura de insecto[illegible]: plicarán algunas gotas de la *Agua de Luz*, á la picadura; y si se sigue h[illegible]n, se pondrán cabezales mojados en dicha agua.

Mal de rabia: Se po[illegible]n en la mordedura cabezales humedecidos en la *Agua de Luz*: tomarà el pacie[illegible]te, ocho ó doce gotas en medio vaso de agua, se repetirà de seis en seis h[illegible]s, por dos dias; despues seguirà tomando todas las mañanas, seis gotas por quarenta dias.

Quemadura: Se aplicarà en la parte quemada la *Agua de Luz*; se ha de observar, el romper las vexigas, si acaso las hay, y en este caso, mezclar la *Agua de Luz* con triple cantidad de agua del tiempo, y se repetirá hasta la curacion; pues està experimentado que luego quita el dolor.

Asphyxia: Se harà lo mismo que se dixo en los desvanecimientos de cabeza, &c.

En los Estudios, y Oficinas, donde las luces, y braseros ocasionan estragos insoportables; para evitar éstos, se ha de destapar un frasquito, y pasarlo por la pieza, ó derramar algunas gotas en ella.

En los Aposentos donde hay enfermos, y en especial en las fiebres malignas, corrupcion de humores, viruelas, peste, &c. se usará lo mismo que en los antecedentes.

Esta explicacion està sacada de varios Autores, que tratan del *Agua de Luz* ó particularmente de la tercera edicion del Diccionario portatil de sanidad, impreso en París año de 1768; el que dice: que todos los Curas de los Lugares debieran estàr prevenidos de esta *Agua de Luz*, para poder remediar à los pobres desdichados que están en el campo expuestos á algunos de éstos accidentes.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana

Observations on D. Don Manuel N. Arboledo's
case by Doctor Alexander MacLaurin. —

Many Remedies have been
recommended for Paralysis, but
before any scheme of cure can be
laid down, every circumstance relative
to its causes, the patients habit of
body, and previous state of health,
should be carefully considered. —
From Don M. Arboledo's description
of the Gentleman who is the subject of
the above case, as well as from the
written document, I am inclined
to consider Plethora as the principal
remote cause of his disease. — The
hemorrhage from his nose, corpu-
-lent habit, and period of life (Æt. 53)
seems all to confirm this supposition.
From the period which has elapsed
since the Apoplectic Attack, and
subsequent circumstances, I am
of opinion that there is little reason
to hope for a cure. — I would however
recommend, that if Plethora still
exists, copious and repeated blood-
-letting should be tried. — or cupping
the temples and back of the neck.

Emetics in any form are improper and should be abstained from.

Indeed it may be considered as a matter of regret that they were formerly tried. For the Hemiplegia which now exists, I would recommend Galvanism or Electricity, and Volatile stimulating Embrocations. — The remedies most likely to afford internal relief are the Oxyd of Zinc, Volatile Salts, Poetic and Stimulating Gums, Mustard, and the Horse Raddish root (Radix Raphanus Rusticanus) in large quantities. — From the evident improvement which took place while the ulcer continued to discharge, it might be worthy of trial to renew this discharge which may be easily effected by means

of a blister applied to the ulcer
cicatrizing, and its future discharge
should be promoted by being
dressed with the Unguentum Sabinæ.

The patient ought to abstain
from animal food and wine. —

(Signed) Alexander Maclaurin M.D.

Kingston Jamaica 3rd Nov. 1817.

ARCHIVO HISTÓRICO
La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA



Agua de arroz de castilla, Modo de hazerla.

Tomese vna cucharada de Arroz de castilla lavado, y pongase en libra, y media de agua caliente, a q cuesa por vn quarto de hora en vacija vidreada: Despues se le añade vn poco de azucar la suficiente, a vn grato sabor, q no este mui dulce, o vn pedacito de canela entera.

Esta agua, q se llama agua de Arroz medicinal, es vna verda de grandissima utilidad, en todos los fluxos de vientre, con irritacion, y fiebre lenta.

Emulcion, y orchata abstringente en los anjos acompañados con irritacion, y fiebrecilla.

Tomenje, semillas de Melon, de Sandia, de calabaza dulce, y pepinos de Castilla, o delas q huviere (q no esten rancias) mondadas, tres ochavas, y seis almendras frescas descolladas; Se machazan bien (hasta q se hagan maza) en mortero de Jaspe, y sele ỹran anadiendo dos onzas del agua de Arroz de castilla dha, q [illegible] con Azucar, se desleyran bien, y despues colora q. vn paño, con expresion, q suelte toda la substancia. A esta Orchata se le ha de anadir vna onza de Xarave de Symfito.

Esta cantidad se hade dividir en tres partes iguales, para tres tomas en el expacio de vn dia.

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTAMARIA

Universidad de La Sabana
Centro Republicano Luis López

Receta p.ª curar las Cacaxedones.

Tomese dos Onsas de Besuguillo (o Raiosilla) bien pulberizado, pongase en una Olla bidriada que no Chupe la humedad, echesele encima una lib.ª de agua con dos Onsas de Vino, mezclese bien todo, y pongase en un fuego de Brasas lento hasta q.e hierba: en empezando á hervir mantengasele el mismo fuego, menease de quando en quando, con una espatula de Palo, hasta q.e se consuma toda la humedad, y la parte dura que queda ès el lenitivo extracto q.e se molerá muy sutil. Tomese la Raiz de Zipo, muelase de modo q.e quede impalpable: tomese tanta cantidad de el extracto quanta se quiera, y la mesma de la dha raiz de el Zipo, misturese bien en una piedra de preparar y guardense los polbos para el uso q.e en el siguiente.

Tomense 36. granos de dhos polbos, y 24. de Polbos de Azucar de castilla, podrid, misturese bien, y dividanse en tres papelillos iguales, que tomará el enfermo, uno a las Cinco de la mañana en ayunas, otro a las seis, y el tercero a las siete, advirtiendo que si le llama a bomitar se le daran una ó dos escudillas de agua tibia, pero en todo caso se procurará no bomitar. A las Ocho se le dará una taza de caldo, y si la bomitare se le dará otra pasado un rato. Se advierte q.e estas tres tomas causarán al enfermo una gran descomposicion q.e le durará hasta las diez de el dia, poco mas ó menos.

La comida será al medio dia reducida a una Sopa de pan de Agua cocha con Caldo de Sustancia, dos huevos, esto es, uno p.r arriba y otro p.r abajo: Un Huevo duro echo rebanadas y Un medio Pollito asado en Caldo, sin manteca, ni Sal, que se Asará bañandolo quando lo seca el fuego con el Caldo de la Sustancia, q.e tendrá la Sal necesaria p.r q.e le salga al Pollo ya asado: lo mismo tomará de cena, menos el huevo. El Agua ordinaria será de la tinaja.

Las tres tomas q.e se dexan, se pueden reducir a dos, y ganará dia, y quarto de el segundo al primero.

Estos polbos se toman p.r tres dias seguidos, pero si el enfermo está debil, se puede dejar uno ó dos de intermedio, y si sintiere mucha debilidad, se le dará un bario corto de Vino, con un pedazo de Bizcocho todas quatro de la tarde.

Si el paciente es Niño de cinco hasta doce años se le, y mitad una tercera parte de la cantidad de los Polbos. La dieta será de quarenta dias, tomando en toda ella p.r alimento, el q.e se dio en los dias de la toma. No tomará Cacao, Queso, leche, ni otra cosa q.e lo dho arriba. Cuidando se igualm.te de el Ceceno, viento de agua cero, y de toda humedad pues todo daña. Debe cuidar el paciente de q.e aun el alimento q.e toma será moderadam.te pues tomando de una vez mucho hace mal cocimiento.

Nota: El modo de podrir el Azucar es el Sig.te Se pone en agua hasta q.e se esta desatando, y ya en este estado se saca y se exprime, y guarda p.r el uso dicho.

De propia experiencia como q.e los tome dos ocasiones, le pacbengo q.e la bea compo.

cision que anuncia Camará la toma de los Polbos, son Vnas ansias de morir, y en terminos q. no puedo explicar, de forma q. a el mas baliente son Capases de hacer desesperar, y abandonar el remedio: pero pasado un rato y que se desayune el paciente se repone. tambien q. el hambre q. ay en la dieta es sin igual, y q. si vno se cree de repleto el bientre, y es necesario labatibas.

El Padre me aseguró q. la Raiz de el Tipo, sob la habia en la Probincia de Mexico, que es un Arbusto (segun me explicó lo fungo como el morteño en su tamaño) q. se cria en las Lomas bajas q. hace poco, y es conocido entre los Vndios con ese nombre. Que el descubrio la Virtud entre ellos, con ocasion de infestar los pulgos Cierto lugar donde se hallaba y morir mucha gente, menos Vndios como advirtió, q. con esta observacion comenzo á Catequisar á los Vndios hasta q. p.r vltimo a fuerza de Cauterizaciones le descubrieron. Que en la Probincia fungaba q. cra desconocido entre otra Gente el remedio.

Y le pido q. si se facilita como creo, la Raiz, me mande un poco de ella, pues la falta de correspondencia q. tengo me ha embarazado solicitarla.

Recetta p.a la Ydropesia.

Se tomará dos ó tres raises de la Oblita, y p.a otro nombre Quinda, se le quita la corteza y machacada la raiz bien limpia ya sin corteza se hervirá muy bien, y de este cosimiento se toma un pocuelo con el pezo de medio real de Cuemon tostado, q. se toma p.a la mañana en ayunas, y a la noche, si el enfermo quisiere ó pudiere.

Si no hace Operacion una ó dos veces p.a dia, q. sea siendo mui duro el estomago de el paciente, se puede aumentar la cantidad de el Cuemon. Se advierte q. á algunos hace efecto la mayor parte, p.a la Orina, ó p.a el Sudor.

270

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CEFERINO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

insercion, ó modo de conoçer la Bacuna, ó granos q.e salen con insercion de ella, y preservan el q.e den las viruelas verdaderas á los q.e no las han llevado.

Alos quatro, ó tres dias de echa la insercion comiençan á salir en las mismas insiones los granitos pequeños, y redondos con un puntico Negro en el medio q.e es en lo q.e se conose q.e es verdadera Bacuna, y sigue creciendo el grano todos los dias; alos nueve despues de echa la insercion está ya en estado de sacar la materia p.a Bacunar otros, y se conose en q.e está bien levantado el Grano, redondo blanquesino, y con el punto en el medio. Se pica con la puntica de la lanseta en contorno p.a q.e lanque la materia q.e es una Aguita muy Christalina, y sale poco, á poco del grano, entonses se coje con la puntica de la Lanseta, y se introduse picando con ella debajo del pellejito del braso ladeada la Lanseta, p.a no hacer sangre, ni picar demasiado se hasen dos, otres picaduritas, en cada braso, y no se basa la Ropa hasta q.e se seque p.a no limpiar la materia. Es bueno cuidar q.e quando comiensan á salir los granos quedá Comezon no se rasquen p.a q.e no los despedasen, y haya con q.e Bacunar otros.

Alos ocho dias suele dar á algunos calentura, dolor de Cabeza, y secas en los brasos, pero nada es de Cuidado, y cuidando q.e no se mojen, ni hagan disgusto algunos ellos pasan sin remedios, y no hay neseridad de hacer Cama, se puede ocupar en qualquier cosa q.e no sea mojarse todo el Cuerpo, á con Mucha echar labativas de Agua tibia, y unos sudores de borrajas, y amapola, y esto los alivia, y refresca.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS
SEVILLA

El agua p.a Vever Ordinaria Serviza, y Alando hiziendo
sele hechara um poquito de alcyema, y se apartara.
Esta no es enfermedad de Colodar ni de Masa
morrar, y asi el alimento hade ser de Carne p.r
Gallina, cocida, ò asada.
Sele dara um Vomitorio de 3.ß
de Sant. emet. en um poco de cocim.to de romero, y mejo
rana.
Desde el dia siquiente sele dara p.r la mañana
en ayunas 2 hor.s ant.s de almorzar media dracma de Lig
Polv.s epileps. de Marq. z c
q.l pasara con um poco de agua
q.l Vebe ordinario, y 3 hor.s desp.s de haver comido, sele
dara la misma cantidad de polvos con la misma
agua: y esto se continuara p.r 6.s Dias; y al 7.o
sele Repetira otro Vomitorio, y suele no bastar, y
es preciso continuar dejs otros 6. dias de polvos, y
Vomitorio.
Quando proviniere de lombrizes, es muy aprobriada
el agua al cocimiento sic.e (menos si huviere Calen
tura).
℞. 2 manojos de Grama. Polvos de Santico, y Tasn.
de C. C. ana. ℥ij.s Mercurio, vivo y limadur. de hierro
ana ℥ß. Hagase decocion ad.s ante. en Suficiente cantidad
de agua comun à remanencia de 5.s libs. lag.s por de-
cantacion se colara, y guardara p.r el uso.

Metodo el mas eficaz, q.e se ha encontrado, para quitar los frios rebeldes, como Quartanas quotidianas, y Tercianas antiguas, como tamb.n las Tercianas, q.e se han curado, con el methodo comun de la Carcanilla, y haviendose quitado repiten.

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana CHARLES MOORE LIBRARY

Toma una onza de polvos muy Sutiles de carcanilla, media onza de polvos de Ruibarbo, se mistura todo muy bien, y se hacen de ello 20 papeles, por iguales partes.

Dieta

No hade tomar el enfermo por quatro dias mas alim.to que caldos de Gallina, pollo, ó carnero, y de Yerbas de perexil, y Esparrago, ó de yerbas de Yuyos, con una Yerba de Chicoria, muy Sanandos, sus y azafran, pero sino le bastaren los dhos caldos, podra tomar una Sopas, y algun poco de pollo cocido q.e se puede trechar, en la misma olla, en lugar de Gallina, el agua, q.e hade beber hade ser cocida con Yerbas de yuyos, perexil, ó esparrago, con una Yerba de Chicoria

De los 12 papeles vele dara uno en ayunas, otro á las onze del dia, y otro á las cinco de la tarde, con un poco de agua de Lagua bebe el Ordinario, para pasarlos, y los otros nueve restantes vele daran en el mismo Methodo de 3 dias siguient.s Con esto se suspenden y es muy raro el q.e falte.

Desp.s se buelben á preparar otros doce papeles, y vele dara uno en ayunas, y otro a las 5 de la tarde en la misma agua, y porq.e si conviene, que tome alim.to se dispondra, q.e para q.e tome el papel de la tarde hayan pasado cinco horas de la comida, y se hade acabar tamb.n con este ultimo methodo los doce papeles ultimos.

Alg.s veces conviene, q.e tome el enfermo otros seis papeles mas, preparados con media onza de cascarilla en polvo, y una guarta de polvos de Ruibarbo, q.e los yra tomando en 6 dias uno en cada mañana en ayunas.

Si el enfermo fuere nevil, ó no fuese la enfermedad muy urgente se pueden poner tres chavas de ruibarbo solam.te en lug.r de la media onza en cada cantidad q.e se prepara, y si fuere niño o muy flaco, se pondran las cantidades de Ruibarbo ó Cascarilla á proporcion.

Añadiendo una ochava de Sal Ejenjos á cada cantidad, q.e se prepara obra mas seguram.te y si hay obstruccion en Vaso, ó hijada la remueve, y quita mas prontam.te

Quando hay obstruccion se puede poner sobre ella un parche de emplastro de Mitiloto, ó de Cicuta con Amoniaco.

Si acaso alg.a vez q.e sera muy rara, usando el methodo Dho se dho volviese á repetir la fiebre tomara cada quatro horas un papel &

los pólvos siguientes, con el cosim.to de las raizes q. ha puesto q.e tomar la cascarilla.

Pólvos bien sutiles de flor de manzanilla, un escrupulo, q.e es la 3.a parte de una ochava, sal de ajenjos, y antimonio Diaphoretico ux.o al medio escrupulo de cada cosa: se mezclara muy bien, y sirvo p.a una sola toma, y se hade repetir cada quatro horas la misma composicion como ha dho. pero se hade tener cuidado de dar los quatro q.e este el enfermo sin la Calentura.

Manteniendose el Enfermo en cama particularm.te en tiempo humedo evitara las recaidas, pues como las fiebres intermitentes tienen su prin.l crisis por transpiracion, o sudor qualquier viento humedo constipa, y bolviendo el material a la sangre es precisa la repeticion de la fiebre.

Alg.s veces sucede, q.e al tomar los enfermos la segunda dosis, se les buelva por la mañana, y otro à la tarde. es causa Grave esta reaccion, de vomitos, o dolor de estomago: En este caso suele no ser necesario alg.a tome mas papeles, pero si haviendo usado p. los dias siguientes alg.n genero de repeticion, tomara uno solo por la mañana hasta concluir toda la dosis ó porcion.

Si la fiebre se reconociere arrabazillada, se bolvera la cascarilla con ojos de cangrejos

Receta q.a luna purgasion.

Lo primero se dara un bomitorio de tartilla proporcionado a la Calidad.

Despues de aver pasado un dia del bomitorio, se dara al enfermo p.r ocho dias seguidos una pildora de Rey de receta con las quales hade tomar con un baso del cosim.to de hierbas emolientes, q.e es alg.s se sigue.

Cosim.to emoliente.

Raiz de malvisco de Castilla, Raices de fruteillas, Raiz de Chicorias, malvas. de cada cosa medio puñado. A peso de 3 reales de limosa, todo se cosinara bien en 6 lib.s de agua, hasta q.e queden en quatro, y despues se colara por un tercio y este cosimiento el peso de un a.l y sal gruesa, y el enfermo bebera de esta agua fuera de la ~~tarde~~ comida, y de la

tomara con las pildoras, cinco o seis veces cada dia p.r lo menos la q.e le servira de agua ordinaria si quisiere beber mas y en acabandose una se cocinara otra, para q. no solam.te la beba los dias de las pildoras, sino tambien otros quatro dias mas.

Pildoras Balsamicas.

Tomese media onza de aceite comun, otra media de Ruibarbo bien pulverizado, y dos escrupulos de sal de Saturno hecha polvos sutiles, todo se rebuelbe bien, y despues de estar todo bien mesclado, se parte en 8 partes iguales, q.e salen de a poco mas de un dr.a cada una, y de esta se toma una cada dia en ayunas, con un pocuelo de caldo o simp.e emoliente.

Si pasados 15 dias no se ha quitado la purgacion se buelbe a hacer la misma curacion, y queda dha.

Durante esta curacion, y el tiempo de la dieta, se abstendra el enfermo de comer pescado, frutas, y ojas crudas, y del uso de las mugeres, y mucho mas del de los hombres, porq. este comercio le es mas de perjuicio, pega ciertam.te la purgacion, porq. es enfermedad muy pegajosa.

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTAMARIA

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

Supongo q.e toda Epilepsia es de dos maneras
fudopatica, ó simpatica; la primera pende de
vicios de los organos del cerebro contiguos á
la dura y pia mater, y esta es incurable por
ser vicio á natura; la segunda es por vicio de
otras visceras, como se explicaria en las causas,
y por consiguiente es mas leve, y las mas veces
se cura, y q.e sea el q.e actualm.te molesta al Refe-
rido señor no hai duda, tanto por la poca durac.n
de los accidentes, y no ser la convulsion univer-
sal, sino parcial, no pierde el conocim.to, ni que-
da sin memoria, pues se dice lo tiene de si mis-
mo, y de los circunstantes, y quedar despues del
paroxismo expedito en potencias, y sentidos, cu-
yos signos son caracteristicos de la Epilepsia
de segunda especie; y asi me parece q.e algunos
accidos vitriolicos q.e se fermentan en el esto-
mago por la falta de digestion con q.e se dice es-
ta continuam.te, y exaltandose y fixandose en
las tunicas del Ventriculo suelen producir esta
Epilepsia; esto se manifiesta en los accidos q.e se
engendran, mediante la fermentac.n viciosa
del suco pancreatico, y bilioso, q.e irritando los
nervios, y fibras del Ventriculo se comunica al
cerebro, mediando un intestino movimiento,
produciendo una estagnacion impeditiva del
transito de los espiritus animales de q.e resul-
ta la repentina privac.n de sentido, y de la irri-
tac.n nerviosa la contraccion de ellos, y de esta la
convulsion q.e es su causa, agravandose esto por
la curac.n de los empeines, pues de semejantes
curaciones spre. resultan graves enfermedades

por el Retroceso de material ichoroso à la ma-
sa de la Sangre, como lo acreditan todos los
practicos, y la Experiencia, no solo en dhos ca-
sos, sino tambien en la Supresion de qualquiera
Evacuac.n acostumbrada como en la de la
Sangre hemoxxhoidal q.e Removida media-
te el axte causa no solo Epilepsia, sino muer-
te Repentina. En quanto à la Evac.n el uso
de los alimentos q.e sean tenues, como pollo ù
otras cosas de facil digestion, no beba vino, ni
cosa Espirituosa, el temperam.to debe ser tem-
plado, y seco; para preparar el acido del Es-
tomago, y Corregir lo limphatico debe tomar
por ocho dias un vaso de Suero cortado con me-
dia dracma de Cremor tartaro, y un escrupulo
de Sandalo Rubro, y esto à las once del dia tibio
y con dulce si quiere, y pasados los ocho dias q.e
tome media dracma de pildoras cochias al
acostarse por la noche, y à los dos dias bolver
al uso del Suero en los mismos terminos por
dos meses lo menos, tomando cada ocho dias
las dhas pildoras; pasados los quales, para q.e
salgan los Empeines se podrà usar del cocim.to
de Sasafras, de las Bayas de Junipero, de la
Rayz de China, Rasura de marfil, y del Cuerno
de Ciervo, q.e es lo q.e, segun su causa, podrà quan
do no Remover del todo la leve Epilepsia, alivi
arla en mucho, para q.e sus paroxismos sean
muy tenues, ò queden en amago

ARCHIVO HISTÓRICO
Diputación
La Sabana
CIFRANDO SOBERANÍA SANTA MARÍA

Receta para Curar Viruelas

Lo primero conviene mucho que la pieza este abrigada con su arte-
puerta, y bastidor para este clara, y libre de viento, se hade mantener
la pieza, ó quarto donde estan. Los enfermos fresca, y aseada; y q=
por ningun caso se meta candela en ella, ni aun tizon para encen-
der vela, y q en ella no ayan mucha enfermos, ni mucha gente,
porq se calientan. Los quartos, y les es daño a los enfermos, y
antes si bien en tiesta caliente se meten ramas de arboles verdes
a los quartos donde estan los enfermos, y se ponen aguardadas dellos;
y en cecandose estas, se meten otras nuevas, para q se mantenga el aposento
fresco.

La cama solo hade ser en los siete dias primeros con todos / desseq se
tiente algo accidentado el enfermo en adelante / en sus barbacoas
de tablas de Guadnas con solo esteras, ó un cuero de tendido, y ha-
bisarse solo una sabana de lienzo sin q exista les nada de lana,
y q no se arrope la cabeza, ni sea amarren con trapo alguno, porq
antes si bien al tiempo q se hallen accidentados, ó antes, se ande
mostras a raiz de la paja; porq es mui daño el q se acuebate el
calor a la cabeza; y por tanto se advierte q se procure q tenga
el enfermo los piés calientes, y para eso tapados de dia, y de no-
che, y aunq se le sujuen los piés, o las plantas de los piés para
traer el calor abaxo, especialm.te en los siete dias primeros. Y
también se advierte q los q tubieren cuera en la cama los ma
de poner al reves, para q el pelo caiga sobre la cama, y la
carnaza pegue al cuero; porq lo contrario se ha experimen-
tado dañoso.

Despues de los siete dias primeros quando ya an acabado
de caer las viruelas, sean pocas, ó muchas, ya selas puede

pexmita la cobija, roga, y tolchillo q̃ hurahan de alentados, y no mas
q̃ se pueden matener en la cama cobijados de ay en adelante, q̃ hu
ta entonses solo se les pexmite la cama, como un estudio para qeseen
como levantado, y no como en cama, cuias advertencias se ande
traer mui presentes sin dixeniar cosa alguna en ellas.

Desde q̃ el enfermo se siente accidentado, se hade recoger al
quarto en la fourma dicha, quitandose toda roga de lana, y quedan-
do los hombres con solos calsones blancos, ō de lino, y en cha-
maxa de lienso, ō camisa, y su sabana de lienso para cobija
se con ella por el dia, y cobijarse con ella por la noche; y las muje-
res solo con camisa, y naguas; y si esta fuere de bretaña, mejor, sino
tenga nada de lana, ni aun cerca la cama, y la cabecera hadeser
de roja, ō de lienso sino toque cosa de lana.

Desde el primer dia no hade comer nada de carne, ni un caldo de
pollo, y el alimento solo sera de coladas de cebada, y de maiz, y magama-
xa bien cozida, y no con mucho azucar, ō magamaxa de azucar de
Castilla todas sin dulze, ni sal; el qual alimento solo se hade
tomar hasta los catorze dias.

El agua ordinaria sera colada de cebada bien rasgada, y cozida
hasta q̃ reviente el grano, la qual se daxa al enfermo q̃ beva toda la q̃
quisiere sin mezquinarsela, y antes si q̃ beva hasta q̃ vomite muchas
veces con dicha agua de cebada, q̃ les es mui conveniente.

El q̃ cayere con bastante dolor de cabeza, y con dolor de pa-
badillas, de lomos con escalofrio, q̃ luego entre calentura, y otros
accidentes graves, requiere mas cuidado, porq̃ demas q̃ las viruelas
nde ser graves, y muchas; y assi luego q̃ se sinta bastante acciden-
tado, se hade dar una sangria del brazo derecho larga a proporci-
on del sugeto, de manera q̃ aun negro mozo, y robusto de catorze
se ā de sacar diez onzas de sangre; y de
ta proporcion de sangria se hade regular para chico, y viejo, de
manera, q̃ la sangria sea siempre bastante.

Una hora despues de dha sangria se les hade dar un

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CELIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

vomitorio de Jalapa desleido en un poco de agua de avenas ábierta en esta forma: Para un grande se haga medio real Largo de Jha Jalapa y se dinde en dos partes Jguales, y La primera se da una hora despues de Jha sangria, y en haziendo el primer vomito en ceco se le da mucha agua tibia de cebada para q vomiten, y una hora poco mas de aver tomado el primer pagelito, se da el segundo en La misma conformidad, q el primero haia hagan vomitado mucho, aunq no sea mas q La agua q toman con algunas flemas.

Si al dia siguiente aun permanecieren Los accidentes en su fuerza, se hade sangrar deel tobillo, haziendo una competente sangria, y si al dia siguiente aun permanecen Los acidentes, ō desde el segundo, ō tercer dia deq cayeron comenzan a brotar Las viruelas, q se tienen como espinillas, se hade repetir otra sangria deel tobillo, Las quales tienen Lugar hasta el dia quinto, ō sesto de La enfermedad, contandose desde el primer acidente.

A Los q tienen Loquera, delirio, ō sueño, q se quedan dormidos sin despertar, Les conviene refrescarlos mas, porq en señal deq han mas calor, y q La enfermedad es mas grave, y a Los tales, como a Los q tienen dolores de Jabadilla, de Lomo, de cabeza, mucha calentura, u otros semejantes accidentes graves, se les hade dar puchuculada echa en agua de cebada, q se tienta suficientem.te del agua deel Puchucululo, ō a falta deel con agua de Limon, ō de Sidra, y siempre abierto, q se llenen deello mucho para vomitar, Lo qual se hade beber a cantaros, especialm.te en Los tres, ō quatro dias primeros, contados desde el primer acidente, q se tiene, q son en Los q se haze La enfermedad; y assi en Los seis dias primeros es el q se hade poner mas cuidado; porq en ellos se haze La enfermedad.

Y desde el segundo, ō tercero dia, segun ello mostrare, se hade tener gran cuidado con Los ojos, para q no salgan viruelas en ello, y queden ciegos, y tuertos; y assi se hade echar ~~frecuentem.te~~ frequentem.te mas, ō menos, segun Lo pidiere La necesidad deel agua de Los ojos, esto

modo de hazerse, y aplicarse va por dieta relaxada, y de ningun modo se hade huzar de agua fria en los ojos, ni con grita de Alforca, porq es danoso.

Y con esta misma agua se les lava a las mugeres sus partes, y a los hombres las suias en la punta, y tambien las orejas por dentro, y las narizes por las vexulas, q suelen ocurrir a estas partes, lo qual se huza siempre tibio, y despues de esta aplicacion, siempre se hade enjugar la parte en q se hizziere con un trapito para q no quede humedad.

A otros dize el principio, o en el progreso de la enfermedad les suele ocurrir inflamacion a la garganta, o dolor al pescueco, o las fauces, o las vexuelas, q allí ocurren, los quales antes hazer la gargara, q va en la otra dieta, como allí se explica, y con lo mismo se antes laguax la voca a los q les ocurren vexuelas en la voca, o lengua. El huzo de la dicha gargara se hade observar hasta q se les aclare la voz, y no les sobrevenga daño en las fauces, y campanilla, y traqadero. Los q tienen, q no pueden hazer gargara, q se la tragan, lavarles con un hizopito de ellas.

A los q les sobrevienen unas manchas como de Erizipela inflamaciones, o hinchazones, se les antes poner en ellas unos panitos de lienzo mojados en el baño, o cozimiento, q se dize en la otra dieta p. las inperfeciones, o manchas, los quales se antes aplicar bien calientes. Y tambien es bueno ponerles unos panitos mojados en dho cozimiento bien caliente a las pies a los q tienen delito, o locura, o a los q tienen el afecto de sueño, q se estan como privados, temiendo cuidado q no se les enfrien dichos panos en los pies, porq les haza mucho daño, en lugar de hazerles provecho.

A los q les an salido muchas vexuelas, o tienen mucha Alferbrilla, se les haze dar el agua de cebada de ordinario con el agua de Limon, como se tiene dicho, y lo mismo a los q tienen locura, y el afecto de sueño como privados.

Y a esto q tienen muchas vexulas, o Alferbrilla, o q permanecen con graves accidentes, se les hade dar desde el dia sesto por

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

Recetta contra la mordedura de las Vivoras

Composicion.

Hagase una pasta compuesta de iguales partes de los polvos siguientes

Espinoga en la flor del canelo-q.l. hai en el Cauca

Espinoga,	Flor de azufre,
Canela,	Ajos,
Clavos de especie,	Piñones;

dandole consistencia con una corta cantidad de aceite, y avilla si la hubiese.——Se pueden agregar á esta composicion las yerbas siguientes.

la vivídera,	la chupadora
la cortadera,	el guaco
la Capitana,	——

y se guardará dicha pasta bien abrigada para administrarla como se dira despues.

Curacion.

En el momento en que alguna persona sea mordida por una vivora se le dará una ligadura, con un veguco curado, en la parte superior de la mordedura, si fuere posible; como si lo hubiese sido en una pierna ó braze, a fin de evitar que suban el veneno y la inchazon; y si hubiere proporcion se le aplicará una ventosa á la misma mordedura—— Por falta de veguco curado se dara la ligadura con una cuerda untada de ajos.

Inmediatam^te, y sin la menor perdida de tiempo que sea posible, se le hará tomar un poco de la pasta arriba espresada disuelta en aguardiente, y p^r su defecto en agua;

haciendo uso de ella segun los casos, en las dosis siguientes

para un negro	3 granos	Cada grano del tamaño de un garvanzo.
para un blanco	2 granos	
para un indio	1 grano	
para una muger preñada	½ grano	

y en seguida se hara bañar al paciente en agua fria. Estas dosis deben aumentarse ó disminuirse segun la calidad del veneno y disposicion del enfermo; y aun repetirse una hora despues en caso que con la prima toma no hayan desaparecido los sintomas, y sobre todo el dolor de Cabeza que es el principal.

Para evitar ó hacer descender la inchazon si la hubiere, se hara al paciente una incision cutanea en la parte inferior y opuesta á la mordedura, y se le aplicará sobre esta incision un poco de la pasta ó un tejo de olla nueva, y despues se la dará un baño de agua amarga, ó en su defecto de agua comun tibia.

Si se nota que el enfermo arroja mucha sangre p.r la boca, narices &c., por exceso de la dosis de pasta que se le haya administrado; se le hara beber agua tibia y vomitar.

Si le resultare cancer se le bañará con cozim.to de Oja de guayabo dulce, mudado con aguardiente, y despues se le aplicará un tejo de olla nueva, continuando la curacion con echarle en esa parte polvos de un mate de orinar raspado, ó de yerba amarga.

Si el paciente padece retencion de la orina, se le hara caminar, sin que advierta el objeto.

Para cortar el vomito de sangre en un mordido de vivora, es muy bueno hacerle beber agua de amoniaco.

Ultimamte se le pondrán lavativas de agua de manzanilla con rapadura ó miel de caña, para que evacue la sangre estravasada.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana

Receta.

para curar la mordedura

de

Vivoras.

Relacion de algunos esperimentos hechos en las salas de medicina clínica de Roma, por el Profesor José de Matthaeis, dirigida á Su Eminencia Reverendísima, el Señor Cardenal Tomas Bernetti, Secretario de Estado de Su Santidad.

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTA MARÍA

Eminentísimo Príncipe

La filantrópica solicitud con que V. Emr. se ha dignado satisfacer mis ardientes deseos, suministrándome una suficiente cantidad de la nueva quina del Pirayó, para esperimentarla en las salas clínicas, me impone ahora el honroso deber de presentarle por la prensa el resultado de los esperimentos médicos que se han hecho. Y antes de todo sean dadas sinceram.te infinitas gracias á la paternal bondad del soberano pontífice, Gregorio XVI., dado ciertamente por la divina providencia para beneficio de los hombres; porque apenas se le supplicó, quiso ser generoso y sabio dispensador del obsequio de aquella cortesa, que le había hecho el gobierno americano de la Nueva Granada, destinando por medio de V. Em. alguna libras p.a el uso de las salas clínicas, despues de haberlo suministrado al gabinete de materia médica del archiginnasio, y tambien al análisis química, para hacer conocer mejor su composicion y naturaleza: empleo verdaderam.te nobilísimo y saludable, que auxiliando los progresos de la ciencia, no ménos que las necesidades de la humanidad, honra al excelente príncipe con lo que hay de mas honroso, que es la utilidad pública. La interesante carta que me ha dirigido mi colega el S.r Dr. Foletti, profesor de materia médica, (diario arcade de Roma, vol. 75 y 76, mese de febrero y marzo 1833, pag. 129 á 139) espone con esactitud los caracteres esternos de esta cortesa, fuera de otras muchas noticias históricas sobre la misma, no ménos que el análisis química practicada por el otro ilustre profesor de farmacia, el Señor Pedro Peretti. Se confirma por este análisis lo que otros habian anunciado antes: la falta de la quinina y cinchonina en tal especie de quina nueva, la cual en vez de aquellos principios, presenta un nuevo alcaloide, en el cual es de suponerse, con bastante probabilidad, que reside la virtud antifebril de la misma como en la quinina la de las otras quinas, y en otros alcaloides aquellas de otras muchas sustancias medicinales, por ejemplo, de la morfina en el opio, de la emetina en la ipecacuana, de la estricnina en la nuez vómica, etc.a Para uniformarse con el uso introduzido en la ciencia, ha parecido bien dar á este nuevo alcaloide el nombre de pitaina, sus-

tancia

poco amarga en su estado sólido y puro, pero de grande amargura al punto que salificada con los ácidos se disuelve en el agua ó en el alcool, ó cuando permanece fundida á una temperatura mas alta de 100°, pues en tal caso despide vapores amarguísimos. Habria sido ciertamente un doble placer para nosotros, si á los esperimentos antifebriles efectuados con la nueva quina en polvo, hubiésemos podido agregar otros hechos con la pitaima, y obtenido efectos proporcionados, como es lícito suponerlo. Mas este nuestro justo deseo no ha podido ser satisfecho hasta ahora, porque despues de los muchos esperimentos de la corteza reducida á polvo, no quedó cantidad suficiente para sacar de ella, con los reactivos químicos, una dosis bastante de pitaima, que pudiese esperimentarse de una manera concluyente y segura. Debemos entretanto, declarar que la falta absoluta en esta nueva quina, de la quinina y cinchonina propias de las verdaderas quinas, y la ignorancia en que estamos hasta ahora, del género y de la especie á que pertenezca el arbol de que se ha estraido esta corteza, (no conociéndose todavia por ninguna descripcion botánica) hacen bastante verosimil la opinion de aquellos que creen deba numerarse mas bien entre las falsas, que entre las verdaderas quinas. Pero sea cual fuere el verdadero género y la verdadera especie botánica de la corteza del Pitayó, nosotros por los efectos saludables que hemos esperimentado en las salas clínicas de la Universidad, no podemos dudar en modo alguno de la eminente virtud febrífuga que la distingue.

La estraordinaria sequedad del estio pasado, prolongada por casi todo el otoño, ha influido de tal modo que han sido rarísimas las fiebres, y pocos los enfermos que se han visto en el hospital de Roma de tal enfermedad, contra lo que sucede ordinariamente. Esta feliz y favorable escasez de febricitantes no ha disminuido, sino solo retardado por algunos dias, el conveniente número de nuestros esperimentos públicos. En estio, y precisamente desde el fin de Junio á principios de agosto, se han sometido 14 enfermos, entre hombres y mugeres, al uso de la nueva quina. Sus fiebres, aunque todas manifiestamente periódicas é intermitentes, han sido de distintos tipos, y diversas tambien por su cualidad y circustancias. Las hubo allí con tipo de terciana y de cuartana, no faltaron perniciosas, habiendo habido entre ellas dos biliosas, algunas desenvueltas recientemente, otras inveteradas y despues reproducidas en aquellos dias. Para disiparlas, casi nunca nos vimos obligados á aumentar la dosis de dos onzas

ARCHIVO HISTORICO
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTA MARIA
Universidad de La Sabana

y media de la nueva quina, dividida cada onza en seis papelitos, y administrada con intervalos proporcionados de tiempo en las horas de intermision. En una sola cuartana la dósis fué aumentada hasta dos onzas dos tercios, sin llegar nunca á las tres onzas; supuesto que solas dos onzas han sido casi siempre suficientes para la curacion, y algunas veces ménos. Dos de estas intermitentes solamente fueron de primera esplosion, es decir, suscitadas entónces por la primera vez; pues todas las otras eran reproducidas en cuerpos que las habian sufrido otras veces, ó en el mismo año, ó antecedentemente. En suma, dos libras y media de la quina Pitayó se consumiéron con feliz suceso en la cura de las fiebres de estio, queriendo nosotros reservar una dósis todavia mayor p.ª el otoño, estacion tanto mas propensa á las mismas fiebres, que las hace mas obstinadas y mas graves, á juicio del mismo vulgo. Por lo tanto, al comenzar noviembre volvimos á los mismos esperimentos, y en todo aquel mes hasta la mitad de diciembre, fueron tratados con la nueva quina otros 16 enfermos con fiebres periódicas de diverso tipo, cuatro de las cuales con el de cuartana, y casi todas acompañadas de obstrucciones al hígado y al bazo, efectos ordinarios de los repetidos accesos de las mismas fiebres, que con tales complicaciones suelen ser mucho mas pertinaces y rebeldes. No obstante esto, administrada la nueva quina con el mismo método y en las mismas dósis, se han obtenido siempre los mismos felices resultados; pues despues del uso de dos onzas de la tal cortesa finamente pulverizada, algunas veces con una dracma demas, otras de ménos, los diversos febricitantes salieron todos curados de las salas clínicas, algunos un poco mas presto, y otros un poco mas tarde: y si permanecièron en ellas algunos dias mas, fuera de los necesarios, esto se dispuso para observar mejor el curso de su convalescencia, y asegurarnos mejor de su curacion. Todos conocen la pertinacia y la difícil espulsion de las fiebres cuartanas. Ellas constituyen uno de los oprobios de la medicina, porque frecuentemente se resisten á las mas copiosas dósis de la cortesa peruviana; y no raras veces es preciso esperar su terminacion, mas bien del cambio de la estacion ó del tiempo, que

de los

medicamentos. Al presente, seis casos de cuartana han tenido lugar entre las 30 fiebres periódicas que hemos combatido con la nueva quina; y aunque estuvieron complicadas, segun lo ordinario en las cuartanas, con profundas obstrucciones al bazo, no han resistido en ningun caso á la virtud febrífuga de la quina Pitayó en dosis muy moderada; porque, administrada segun nuestro método, con justa distribucion dentro de los dias del acceso, no hubo jamás necesidad de llegar á la dósis de 3 onzas: pero mas de una onza moderaba ya el paroxismo, y pero mas de otra onza lo cortaba del todo. Asi bastaban ordinariamente $2\frac{1}{2}$ onzas de la nueva quina para disipar enteramente las mas pertinaces entre las periódicas, cuando por el contrario se necesitan muchas onzas de la quina comun, como les es notorio á todos los médicos; y no rara veces sin suficiente efecto, aun uniéndolas á otros medicamentos que se tienen por auxiliares. El ser bastante esta menor dósis de la quina Pitayó p.ª auyentar las fiebres mas obstinadas, como las mas peligrosas, forma la mas segura prueba de su mayor virtud, y de su mas grande eficacia antifebril, de conformidad con la opinion que tienen de ella los mismos americanos.

Mas si esta quina se introdujera en el comercio, adquiriendo bien pronto la reputacion que merece, habria mucho que temer de las adulteraciones acostumbradas de los comerciantes, que aman mas su propio interes, y la utilidad de los otros. Ni semejantes fraudes seria siempre fácil descubrirlos, pues si han tenido lugar en otras muchas especies de quina desde su primer aparicion en Europa, con tanta mayor razon debemos temerlos en la mas eficaz y útil, como la mas aparente para tentar la codicia de los traficantes. La historia refiere que los atenienses habian establecido un magistrado particular (los Sicofantas) que velaba sobre el cultivo, sobre el comercio, y sobre la esportacion de los higos de la Ática, de que eran ellos estremadamente aficionados. Parece seria mucho mas racional y justo que los americanos del Perú y de la Nueva Granada estableciesen un magistrado particular sobre los árboles de la quina de que abunda su pais. El deberia vigilar sobre la cosecha,

y sobre la estraccion de las cortezas, alejando toda suerte de alteracion y de fraude en un género que ciertamente es mas precioso y útil que los Oros, pues qué constituye el remedio seguro de la mas frecuente enfermedad de los hombres, tal es la fiebre periódica, funesta muchas veces y aun mortífera bajo la forma de perniciosa. Y no deberian faltar en los reglamentos de América las correspondientes medidas aun en los puertos de Europa, á fin de garantizar mas las diversas cortezas de quina.

Acepte, Eminentísimo Príncipe, con su acostumbrada bondad esta muestra, bien que pequeña de nuestro zelo y de nuestra inmensa gratitud y veneracion. Tenga ademas la complacencia de proporcionarnos la oportunidad de que la acoja con paternal clemencia la Santidad de Nuestro Señor, que el cielo prospere y conserve largamente para el bien de Roma y de la Iglesia.

Entretanto, permítame el honor de ser de V. Eminencia Reverendísima, humildísimo, devotísimo, y obedientísimo servidor — José de Matthiacis P.P. de medicina clínica en la Universidad de Roma —

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana

Carta di G. Folchi al Illustrísimo Sor. Profesor de Matthaeis sobre una nueva especie de quina, denominada Pitayó.

Habiendo la Santidad de nro. Sor. Gregorio Papa XVI. recibido en don de la república de Colombia una cierta cantidad de quina con la denominacion de Pitayó, que allá se tiene en gran precio, y se prefiere á las otras especies en la curacion de las fiebres intermitentes, Vd. cuidó de pedir á Su Eminencia Reverendísima el Sor. Cardenal Bernetti una muestra, tanto con el fin de depositarla en el gabinete de materia médica de la Universidad, como con el de examinarla por el análisis química, para verificar si la eficacia de esta especie era debida á los alcaloides ya conocidos, ó bien á otra nueva sustancia. Habiéndose dignado Su Santidad de conceder la muestra pedida por medio del enunciado Purpurado, Vd se sirvió darme una parte de ella invitándome á hacer su descripcion, y otra á nuestro Colega el Sor. Profesor Peretti, excitándolo á examinarla químicamente. Por consiguiente era muy justo que yo le dirigiese á V. mis pocas observaciones, que felizmente ha querido robustecer el Sr. Peretti con los importantes resultados de sus indagaciones; deseando reunirme conmigo para darle una prueba de mestra gratitud y obsequio.

Por lo tanto siento no poderle suministrar de mi parte sino escasas é inciertas noticias acerca de la procedencia de esta corteza, no haciendo de ella mencion sino solamente tres autores, en cuanto yo conozco. El Sor Profesor Brera en su Desideratum la llama Pitoya-quina, y dice haber venido el año 1817 de Guayaquil á Liverpool, bajo el nombre de quina peruviana y difundidase de Hamburgo por la Alemania bajo tal denominacion, y aun con la de quina-nueva. Agrega que algunos la han confundido con la quina Tecames ó Bicolorata; porque son tales las diferencias físico-químicas que hay entre estas cortezas, que no es posible reducirlas á la misma especie. Y en efecto, yo que tengo

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTAMARIA

á la vista todas las tres mencionadas cortezas del gabinete, puedo augurar que si la Pitayó se diferencia de la Tacames en sus caracteres, no tiene con la bicolorata la mas remota semejanza. El Sor. Batka de Praga, en una interesante memoria presentada á la academia de medicina de Paris, nombra simplemente la Pitayó, anunciando que tal nombre suele darse en Inglaterra á la bicolorata, y he aqui repetido el mismo error poco antes notado. El que habla con alguna mayor estension de la Pitayó es el Sor. Guibourt, quien en la segunda edicion de su historia de las drogas simples, vol. 1º pag. 456, refiere que una corteza con esta denominacion ha sido recibida de Colombia por el P. de Londres, la que tenia los mismos caracteres que el describe sucesivamente. Agrega despues, que habiendola analizado el Sor. "Henry" hijo, encontró en ella tanta quinina y cinchonina, que bastaria para colocar la nueva corteza al lado de las verdaderas quinas, sino la separasen de estas sus caracteres físicos. Por lo tanto, tenemos mucha razon de dudar, que la corteza de que habla el Sor. Guibourt sea identica con aquella de que es mi objeto hablar, tanto porque los caracteres físicos de ambas no son enteramente conformes, como tambien porque en la nuestra no se han manifestado al análisis los alcaloides propios de las verdaderas quinas. Estas son las únicas noticias que he podido procurarme acerca de la Pitayó, las cuales, como Usted bien vé, poca ó ninguna luz nos dan; habiendo inútilmente consultado la preciosa memoria de Humboldt sobre las quinas, inserta en el "Almanaque de Berlin", el Prodromus de De candolle, el Systema vegetabilium de Roemer y Schultes, la Monografia de De Bergen, y otras obras de Farmacologia y Materia Médica, de que podia disponer.

Las cualidades físicas de las muestras que he tenido por medio de V. son las siguientes. Los pedazos mas grandes estan enrollados por la mitad sobre sí mismos: los menores tienen aproximados sus márgenes á manera de canales; los primeros de mas de un

pie

de largo, de mas de una pulgada de diámetro, y de una linea y media de espesor. La costra esterior formada de la epidermis y de la membrana celulosa, es variable en los diversos pedazos: en algunos, particularm.te en los mas grandes, se obserba un velamento blanco, destruido en gran parte por el rozamiento, semejante al velamento perlaceo de las quinas de Cartagena: en otros la costra dicha es algo esponjosa, tuberculosa, desigual, y ligeramente hendida, en algunos puntos divisible en laminillas y tiene un color ceniciento sucio, alguna vez con mueshas del velamento perlaceo, y ofrece mas adentro un color amarillo rojizo. El liber, ó el tegido fibroso, es compuesto de fibras mezcladas, acumuladas, de color anaranjado rojizo, mas oscuro en la cara interior de la corteza. La fractura desigual, poco fibrosa, y en ella aparecen las fibras casi dispuestas en tegido. El sabor amargo, persistente, desagradable. Algunos pocos ligueres foliaceos se descubren en la superficie esterna.

El lugar nativo del arbol de que se ha sacado esta corteza está en los montes de Pitayó de la Nueva Granada. El género y la especie á que pertenece dicho arbol, estan hasta ahora indeterminados. Conociendo la corteza de quinina y cinchonina, segun las indagaciones del Señor Profesor Peretti, de que luego daré á V. cuenta, parece que no puede asignarse la planta al género cinchona, especialmente despues de las recientes separaciones de este género que ha hecho el Sor. De-Candolle de muchas plantas que indebidam.te habian sido comprendidas en él por otros. Los SS. Brera y Guibourt son de parecer que pertenece probablemente la Pitayó al género Exostemma, y el segundo asi lo prueba, encontrando una grande semejanza entre las voces Pitayó y pitón, que es puntualmente la denominacion de una especie de Exostemma, es decir, la Exostemma floribundum, quina pitón, ó de Santa Lucia, descrita la primera vez por Badier en 1769. Yo no tengo mas que una sola razon que oponer á esta suposicion del Señor Guibourt, y no me parece del todo despreciable. En los árboles que producen las quinas verdaderas ó falsas observamos cierta regularidad y constancia respecto de su lugar nativo: asi, para aducir algunos ejemplos, sabemos que los géneros Lucidia é Hymenodiction son propios de la India Oriental, que el Danais nace en las Islas de

instrati

ARCHIVO HISTORICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRIGUEZ SANTA MARIA

la Africa austral, que el Pinkeneya vegeta en la Carolina y en la Georgia, el Remijia en el Brasil, y asi se puede ir señalando la distribucion geográfica de los demas. Ahora bien el género Exostemma, y particularmente la primera seccion, Pitonia, en la que se hallan contenidos los verdaderos ecostemmas, es propia de las Antillas, region muy diversa de aquella, de donde con certeza sabemos que procede nuestra Pitayó. Pertenecerá ella, acaso, al género Buena? Yo á la verdad me inclino mucho á creerlo, considerando que este, como tambien el genero cinchona, se han encontrado casi constantemente en los Andes del Perú y de la Nueva Granada, patria esta de la Pitayó, y hasta ahora no se conoce mas que una sola excepcion, que recae sobre la Buena hexandra, ó quina del Rio-janeiro que tiene por patria al Brasil. Es inútil que yo le haga advertir á V. que el género Buena es el mismo que Ruiz y Pavon, autores de la flora del Perú, habian llamado Cornibuena, reuniendo el prenombre y el nombre de Corne Bueno, á quien habian dedicado el nuevo género. Pohl, al cual no le agradó esta composicion de palabras, ha suprimido el prenombre, y ha sido seguido de otros botanicos—

Ahora para darle á V. una breve noticia de las indagaciones hechas por el Señor Peretti sobre los elementos de la Pitayó diré: que este sabio químico ha ensayado desde el principio una pequeña cantidad de dicha corteza, y despues ha repetido y variado sus operaciones sobre una dósis mayor. En el primer ensayo él ha dirigido inmediatamente sus indagaciones á descubrir los alcaloides comunes á las quinas verdaderas segun el procedimiento acostumbrado, esto es, haciendo hervir la corteza dentro de la agua acidulada, precipitando el líquido con el amoniaco, y con el carbonato de potasa, y tratándolo en fin con el alcool, al que se añadió un poco de ácido sulfúrico, p.a obtener el alcaloide que se buscaba, en el estado de sulfate. A pesar de toda la diligencia empleada en examinar las materias, no pudo encontrar ni quinina ni cinchonina; cuyo resultado merece ser notado como contrario al del Sor. Henry, y capaz de dar alguna luz sobre el género de la planta de que se ha sacado la quina Pitayó. Mas si por esta parte ha sido infructuosa la indagacion, por otra ha sido provechosa en cuanto

se ha conocido, 1º: Que el precipitado obtenido del cocido hervido, mediante el amoniaco, contiene una sustancia amarga particular unida al tanino; 2º Que una porcion de dicha sustancia se precipita por el alcool, durante la evaporacion, y otra es retenida en solucion; 3º Que el mismo precipitado contiene las dos materias colorantes, soluble y falsa, asi denominadas por el Señor Peretti, y son agujitas que se resisten á la disolucion en el espíritu de vino; 4º Que el carbon animal, que se emplea para clarificar la solucion alcólica, se apodera de la materia resinosa de la corteza, y de una parte de la sustancia amarga; 5º Que si el precipitado obtenido por medio del carbonate de potasa se trata con el éter, evaporado este, se tiene la sustancia amarga en forma de pequeñas agujas cristalinas, que disueltas en el ácido acético hacen amarguísimo el líquido; 6º Que el cocimiento de la quina Pitayó en agua pura se enturbia enfriándose, tiñe ligeramente de rojo el papel de tornasol, precipita en coagulo la gelatina animal, en pardo el persulfato de hierro, y suministra tambien un sedimento con el carbonate de potasa y el oxalate de amoniaco; 7º en fin: que haciendo hervir primeramente la corteza en el agua pura, y despues en el agua mezclada con un poco de ácido hidroclórico, y precipitando uno y otro cocimto con el amoniaco, si los precipitados se tratan con el eter, y se volatilisa el solvente, se tiene la sustancia amarga en forma cristalina; y este, á juicio del Señor Peretti, es tal vez el mas compendioso y espedito medio de procurarsela.

Hecho este ensayo, ha practicado dicho químico sus operaciones sobre una dósis mayor de la Pitayó, y he aquí en compendio la serie de sus operaciones. Ha hecho hervir seis onzas de corteza en la agua destilada, y ha reducido el cocimiento á estracto que tenia el peso de dos onzas: tratando este con el alcool de 34º, una porcion se ha disuelto y se ha puesto por separado; la otra no disuelta ha ofrecido los caracteres de la goma y del galate de cal. A la solucion alcoolica se agregó un poco de agua, de modo que destilada ha dejado un residuo acuoso, que teñia de rojo el papel azul, precipitaba en coagulo la gelatina animal, se enverdecia con

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

el Sulfate de hierro, y tenia un sabor amarguisimo y astringente. Estas cualidades ya denotaban bastante que contenia el tanino con exceso de ácido gálico, la sustancia amarga, y la parte colorante. No obstante esto, se ha precipitado la solucion con el amoniaco, y una porcion del sedimento blanco amarillento tratado con el eter, ha dado por medio de la evaporacion el tanate de la sustancia amarga ó del nuevo alcaloide, dejando aparte la materia colorante falsa—

El remanente del sedimento blanco amarillento se ha puesto en contacto con el agua hirviendo, y se ha disuelto en parte: de la otra hablaré luego. En la solucion acuosa se ha infundido un poco de ácido sulfúrico: clarificado el líquido con el carbon animal, añadido despues un poco de carbonato de cal para quitar el exceso del ácido, y elevada la evaporacion hasta la sequedad; el residuo se ha disuelto en el alcool, y con la evaporacion de este se ha obtenido el sulfate del nuevo alcaloide, bajo la apariencia de pequeñas agujas cristalinas dispuestas en abanico—

La parte del sedimento no disuelta en el agua hirviendo se ha cimentado con el hidrate de potasa, y ha formado un líquido de un rojo de rubí: vuelta á tomar la potasa con un ácido, se han deportado las dos materias colorante, sólida y falsa—

Advirtiendo el Señor Peretti que el carbon animal goza de la propiedad de absorver y retener algunas de las sustancias en que se emplea p.ª depurarlas, y sospechando que en la operacion poco antes referida se hubiese apoderado de una porcion del sulfate del alcaloide, supuesto que de este se habia obtenido una muy corta cantidad, lo trató primeramente con el alcool simple hirviendo, y así pasado recuperar alguna parte del sulfate. Considerando despues que la parte colorante, sobre la cual ejerce el carbono la mayor afinidad, sirviese de impedimento para que del mismo estrajese el alcool todo el alcaloide, ha hecho obrar el alcool hirviendo con la adicion de hidrato de potasa. De este modo obtuvo un líquido amarguisimo de color de esmeralda, que se mudó en amarillo pálido, estraida la potasa mediante el ácido sulfúrico. Evaporado despues el espíritu de vino, tratado el residuo con el eter, y dilatada la solucion etérea con el agua destilada, ha obtenido la

mayor

parte del nuevo alcaloide, que apenas conservaba una pequeña porcion de la materia colorante; y este ha sido el caso en que se ha manifestado la sustancia amarga alcaloidea en toda dóis mas significante.

Despues de haber dicho que la corteza de Pitayó en seis onzas de peso, habia sido hervida en agua pura, y el cocimiento reducido á estracto sobre el que se siguiéron las operaciones referidas; resta añadir que la misma corteza se ha hecho hervir de nuevo en el agua unida con el ácido oxálico, y que mezclado en el cocimiento el amoniaco, se ha obtenido un precipitado rojo amarillento. Cincuenta granos de este tratados con el eter han dado un liquido amarguísimo, tinturado de amarillo; y volatilisado el eter, ha quedado un residuo gramuiento compuesto de mucha materia colorante sólida, de un poco de ácido gálico, y de la sustancia amarga. La combinacion de la sustancia amarga con el tanin, observa el Señor Peretti no ser nueva en la química orgánica, porque en este estado se presentan la salicina en la corteza del sauce, la quinina y la cinchonina en las verdaderas quinas, &c.ª Ni puede dudarse de la combinacion antes dicha; pues si, ademas de las otras pruebas, se disolviere en la agua destilada el estracto alcóolico de la Pitayó, se clarificare el liquido con el carbon animal, y, evaporado se hatare el residuo con el espíritu de vino frio; se tendria una tenue cantidad del alcaloide combinado con el ácido hidroclórico, proveniente tal vez del carbon preparado; y la parte no disuelta por el espíritu será galato de cal. Mas si el carbon empleado en este ciemento se lavare perfectamente en alcool que tenga en disolucion hidrato de potasa, se podrá obtener todo el alcaloide unido al tanino.

En fuerza de estos esperimentos se cree autorizado el Señor Peretti á concluir que la quina Pitayó contiene

Una sustancia amarga de índole alcaloidea
Dos sustancias colorantes unidas al ácido gálico, que forman el rojo cinchónico de los químicos franceses.
Galato de cal
Goma
Resina
Parte fibrosa

Los

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana CRISTINA RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

caracteres del nuevo alcaloide, que respecto de su procedencia podria llamarse pitaina, son principalmente: el no tener notable amargura en el estado sólido y puro, cuyo caracter se desenvuelve quanto veces se disuelven en el agua, en el alcool, ó en el eter, las sales cristalizables y solubles que forma con los ácidos. Tambien es amarga la solucion del alcaloide simple en el eter ó en el alcool, en los cuales ligeridos es muy soluble, y de donde se puede tener en estado cristalisado. Se funde á una temperatura mayor de 100°, y exala primero vapores amarguísimos, que recogidos se condensan en menudísimos prismas: despues exala vapores empireumáticos, que encontrando un papel teñido de azafran le enrojecen. Se descompone por la accion del ácido nítrico caliente y concentrado. Se combina con el ácido sulfúrico en la razon de 96 partes del alcaloide y 4 de ácido, y forma una sal blanca amarga en pequeños prismas divergentes á manera de un abanico — Con el ácido acético compone una sal amarga incristalizable —

El Sor. Berzelius, en el tomo VI. pag. 223 del tratado de química, hace mencion de una corteza procedente de la Colombia, y numerada entre las quinas: mas esa se distingue de nuestra Pitayó, en cuanto que contiene la quinina y la cinchonina, segun el ensayo analítico del Sor. Luhlman. Me parece mas bien que se acerca á la nuestra en la composicion química otra corteza, de la cual habla igualmente el Sor. Berzelius en el vol. citado á la página 222, bajo la denominacion de quina nueva, tanto mas que por aseveracion del Sor. Brera la misma denominacion se le ha dado en la Alemania y en otras partes á la Pitayó. Los SS. Pelletier y Caventou, que la han analisado, han sacado de ella sebo, una sustancia resinoide roja, tanino, una materia colorante amarilla, goma, almidon, ácido quinóvico, y han temido indicios de un álcali vegetal, que el Señor Gruner mira como una base particular. De cualquier modo que sea, yo tengo por seguro, que mas bien la esperiencia médica que las investigaciones químicas pueden probar el valor de una nueva especie de quina,

particularmte

en nuestro suelo, donde p.r la obstinacion de las intermi-
tentes han salido fallidos muchos febrífugos que en otra
parte gozaban de mucha celebridad. Y ninguno cierta-
mente mejor que V. está en el caso de hacer la prueba
en el lecho de los enfermos, siendo uno de los profesores
de nuestra clínica médica, y en otro tiempo autor de
los primeros esperimentos hechos en el mismo Instituto
sobre el sulfate de quinina, la emetina, la morfina de-
de los cuales V. ha dado cuenta en una carta inserta
en las "Efemérides de Roma" —

ARCHIVO HISTÓRICO
Universidad de La Sabana
CIPRIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

Observaciones sobre los síntomas del Cólera asiático

1º Medios preventivos contra los síntomas precursores del Cólera. Pueden resumirse así estos síntomas: abatimiento, malestar general, mal gusto de la boca, inapetencia, sensacion mas o menos dolorosa en el epigástrio, borborigmos acompañados de cólicos, o dolor alguna vez: en ciertos casos opresion torácica, pero nunca diarrea ni vomito.

Estos síntomas constituyen un verdadero embarazo gástrico, que se combate con algun laxante salino, magnesia ó cebe amarga, agua de Sedlitz &c., y hasta con la hipecacuana si hay saburra en la lengua &c.ª Dieta absoluta &c. (No debo entrar en pormenores que todos conocemos)

2º Medios curativos contra la Colérina, cuyos principales fenómenos son: en primer lugar, los síntomas precursores y la gran debilidad de las piernas; ademas, nauseas ó una especie de ansia epigástrica; rara vez vómitos, que en tal caso son de materias biliosas, y no de color ó aspecto de arroz como en el Cólera; siempre deposiciones diarréicas, generalmente sin dolor, y acompañadas de una explosion de gases. Estas deposiciones son líquidas, amarillentas, biliosas, mas ó ménos estercoladas.

Estos síntomas se combaten, tomando tres veces al dia, por la mañana, al medio-dia, y por la noche, en una taza de infusion de manzanilla, una ó dos cucharadas del siguiente líquido.

℞. Agua comun ——— 1 libra
Deuteroclorure férrico bien sublimado ½ dracma
Jarave de meconio ——— 2 onzas.
id. de menta ——— ½ onza
id de canela ——— ½ onza
Mézclese — (Remover la botella cada vez) —

Si la diarrea fuese muy abundante, se aumentará la dósis de la anterior pocion, y se propinarán ademas cortas lavativas de almidon con cuatro ó cinco gotas de láudano &c.

Dieta mas ó ménos rigurosa, segun los casos.

Cólera confirmado.— Las deposiciones amarillas van revistiendo un color ménos estercolar, casi sin olor al principio, y del todo inodoro después componiéndose de un líquido muy claro y ligero, semejante al suero, en el cual se halla disuelta la albumina que le da el aspecto de arroz, y se deposita después de la refrigeración en el fondo del orinal.— La debilidad aumenta mas y mas con la mayor rapidez; hay dolor lumbar ó de riñones, y la orina sale albuminosa, y se suprime de repente después de los calambres. En fin, el vómito de los vómitos es semejante al de las evacuaciones anales.

El rápido enflaquecimiento de la cara y demas, el frio progresivo de las extremidades y de toda la piel, la depresion del pulso, el hundimiento de los ojos en el fondo de sus órbitas, el cárcamo vinoso de los párpados, y progresivamente de toda la piel en la direccion de las venas, y el sudor viscoso, rara vez acaso se presentan despues.

Los vómitos y las deposiciones aumentan con la refrigeracion de la piel.

La lengua está fria, y sus papilas son de color rojo; el aliento es igualmente frio, y de un olor particular, sui generis.

La voz se pone ronca, y su extincion tiene lugar generalmente con la de los latidos de la arteria radial y demas, que desaparecen desde la periferia hácia el centro.

El pellejo en la piel tarda á desaparecer como en un cadáver.

La inteligencia se conserva generalmente hasta el último momento.— Pero en este período, los calambres, los vómitos, y las diarreas cesan completamente.

Tales son los síntomas principales y mas regulares del Cólera asiático.

Medios contra el Cólera.

Como lo mas urgente es contener los vómitos y la diarrea se propinará inmediatamente al enfermo el Sesquicloruro férrico Sublimado, (de ningun modo el percloruro simple, porque tiene un exceso de ácido Hc), en la forma siguiente.

℞.— Agua destilada ——— 4 onzas.
Sesquicloruro férrico, ó sea
Percloruro sublimado ——— 1 dracma

Mézclese.

Se toma una cucharadita de este líquido, y se pone en un vaso de agua comun, que beberá el enfermo en dos veces, la mitad en seguida, y la otra mitad al cabo de diez é quince minutos. Al propio tiempo se administra una lavativa compuesta de un vaso de agua igualmente fria, pero sin azucar, y una cucharada de la misma disolucion de Sesquicloruro de hierro.

Solo se da la mitad de esta en lavativa, y al cuarto de hora la otra mitad — Total: una cucharada de Sesquicloruro por la boca, y otra en lavativa, en dos veces, y en un vaso de agua cada una. — Estas mismas dosis se repiten en la misma forma cada media hora, cada hora, ó cada dos horas, mas ó ménos, hasta que cesen los vomitos y la diarrea. — Una vez obtenida la cesacion de las evacuaciones serosa-albuminosas, se pondrá una cucharada de la misma disolucion de Sesquicloruro férrico en tres cuartillos de agua comun ó naranjada semi-helada, que el enfermo beberá á gusto cada cuarto de hora, mas ó menos, segun la sed que tenga.

En el período álgido se favorecerá la reaccion con infusiones de thé, manzanilla, menta pipperita, yerba luisa, tilo, añadiendo en cada taza cada hora, tres ó cuatro gotas de Espíritu de Mindererero, dulcificándolas con Jarabe de Ether y Canela, á partes iguales. Todo esto, sin perjuicio de ir propinando al propio tiempo la disolucion del Sesquicloruro férrico, que es la base del

del tratamiento.

También se deben aplicar á la vez sinapismos ambulantes, saquillos de salvado ó arena, bien calientes, alrededor del cuerpo, al objeto de

Una vez obtenidas las reacciones, es decir el calor de la piel, y la reaparicion del pulso, si este se presenta duro, ondulante, y hay síntomas de congestion cerebral, pulmonar, renal &c., se hará uso de las ventosas, las sanguijuelas y aun de la sangría corta, segun el grado de la congestion, fuerza del pulso, y temperamento del enfermo.

En una palabra, se pondrán en juego todos los medios conocidos para combatir las complicaciones que suelen presentarse en el cólera.

Mucha agua-nieve á cada instante con azúcar y limon, ó agua helada, que forma una especie de limonada pétrica, es lo que conviene para apagar la ardiente sed que devora á los coléricos.

Si los medios indicados no alcanzasen á vencer prontamente la atonía de la piel, se darán baños de vapor seco, que mando es, la cama (preparada con ellos para que no se incendie la ropa) una mezcla de alcohol y ether aceticos, partes iguales, con una pluma ó otro cuerpo, la pierna &c. La ropa de la cama ha de estar bien sujeta, de modo que el enfermo no respire el vapor ardiente de las carnes. Es un excelente medio de reaccion y sudorífico.

Las irrigaciones con el agua clorúro-amoniacal frente de la habitacion del enfermo, como del resto de la casa, serán muy útiles para el paciente, y un buen medio de preservacion para los que le asisten.

290

ARCHIVO HISTÓRICO Universidad de La Sabana CIRILIANO RODRÍGUEZ SANTAMARÍA

RECETA

SACADA DE AUTORES INGLESES,

Y MODO DE TRATAR AL ENFERMO DE VIRUELA,

POR UN AMIGO DE LA HUMANIDAD.

SINTOMAS— Calentura inflamatória, sueño, dolor en el estómago y espinazo, vómitos Al tercer dia brota la erupcion en la cara, cuello y pecho, manifestándose en puntos rojos, parecidos á la picadura de pulgas, los que van estendiéndose por todo el cuerpo hasta el quinto dia, que aparecen vejiguillas redondas, llenas de un fluido transparente colocadas en la superficie de cada grano: en este estado la fiebre calma. El dia nono se dejan ver las vejiguillas formadas perfectamente, y llenas de una materia espesa y amarilla; la cara y cabeza se hinchan. El undécimo dia, la materia en las postillas es de un color amarillo oscuro, la hinchazon de la cabeza desaparece, y pasa á los pies y manos: la calentura reaparece, las postillas rebientan, dejando marcas que muestran cual ha sido la causa por todo la vida.

Tales son los síntomas de las viruelas simples, que algunas veces toman un carácter mas terrible, y entonces las distinguen bajo la denominacion de confluentes. En este caso todo es mas violento desde el principio; la calentura es fija, precedida de desvelos, calor, sed, vómitos, &: la erupcion es irregular, apareciendo en manchas cuyas postillas son chatas y la materia de un color pardo; la calentura se aumenta desde el quinto dia y continúa durante la enfermedad; la cara se infla de tal suerte que los ojos quedan ocultos, y algunas veces aparecen síntomas pútridos desde el principio.

TRATAMIENTO — Téngase el enfermo en un cuarto bien ventilado, y cubierto con una sola sábana. Púrguese cada cuarenta y ocho horas con sal de inglaterra, ó épson, dándole treinta gotas de láudano todas las noches. Por alimento se le dará coladitas de sagú, y claritas de arros de castilla; la bebida será de agua, ó limonada hervida. Si la erupcion se irrita notablemente, úsese el baño cálido. Dénsele sueros clarificados y cálidos, mesclados con un poquito de vino; cataplasmas á los pies Si los vómitos no quieren ceder, dénsele dos dragmas de sal tártaro, treinta gotas de láudano y seis onsas de agua.

En las viruelas confluentes, el tratamiento debe variar segun se manifieste la fiebre, con el carácter de inflamatória, ó pútrida; en el primer caso, trátese como se ha dicho; en el segundo úsese de los remedios propios para la fiebre pútrida. Si de los ojos padece mucho, báñenselé con lechè tibia, y úntesele con una pluma de una mescla de aceite de almendras y manteca de cacao.

Cuando la petechiæ, alfombrilla, ó manchas moradas, negras ó cárdenas aparecen con las viruelas, es preciso administrar la cascarilla en polvo en grandes cantidades como sigue—

Para un niño, se mesclan dos dracmas en tres onsas de agua, una onsa agua de canela, dos onsas jarave de naranjas ó de limon y media onsa de espíriu de vitriolo; dando al paciente una cucharada por cada hora.

Para un adulto se mesclan las mismas cantidades, y se dan cuatro cucharadas por hora.

En este estado del mal, no debe perderse tiempo, porque la conservacion de la vida depende de la eficaz administracion del anterior medicamento que debe hacerse tomar al enfermo tanto cuanto permita su estómago.

VACUNA.

Ninguna persona debe despreciar el preservativo de la vacuna, cuyos síntomas son estos:

Al segundo dia de aplicada, se nota una pequeña manchita colorada como la picadura de un mosco, la que al cuarto dia se cambia en un granito rodeado de un círculo rosado, que al quinto se transforma en una ampolla llena de un fluido claro. El sesto dia la ampolla está mas bien formada, presentándo un círculo perfecto algo aplastado y cuyo color es obscuro. Al octavo y noveno dia se sienten escalofrios con algo de calentura, acompañando una pequeña inflamacion á la vacuna, con dolores de aquel punto á la sobaquera, cuyas glándulas suelen irritarse. El décimo y undécimo dia, la vacuna se vé rodeada de un círculo color rojo subido, y esta es la seña mas convincente de lo genuino de ella.

TRATAMIENTO —Si el dolor é inflamacion de la vacuna son exesivos, se calman con aplicaciones frescas, un purgante de sal, dieta y sosiego.

Impreso por Benito Zizero. — Cali, 14 de Julio de 1840.