

Instrucción po^a la asistencia
del M^r Arrobiro

1. — Tomaría dos veces al dia un papel de lo que quedan preparados; y luego que haya comido este díos, podrán tomar un pañuelito mas por la noche, si la cantidad de orina no se aumenta en una proporción suficiente para disminuir la hinchazón.—(cada papel de estos se compone de 4 gr. polvo de escila: 4 gr. polvo de digital; y 6 gr. de nitro).

2. Todas las noches tomaría una píldora de las que quedan preparadas; y si no fuere suficiente esta díos, para mover suavemente el estómago, tomará otra píldora ésta mañana. Pero debe suspender el uso de estas píldoras si le causan evacuaciones prematuras, y también en el caso que haya alguna irritación à las encías.—(cada píldora se compone de 4 gr. jabón medicinal y 4 gr. de calomel).

3. Las fricciones mercuriales se le harán todas las noches, hasta que se agote la cantidad de unguento que hay en el tarro; y solo se suspenderían si hay alguma irritación en las encías.

4. El vendaje es conveniente aplicárselo todas las mañanas. Por las noches se le durará un baño de vapor de sosa; y en defecto de ésta, de cualquier otra hierba aromática, como manzanilla, verbabueno, ó hojas de naranjo; procurando que la acción de este vapor no pase de la rodilla; y teniendo el

muy

muyor cuidado en evitarle alguna quemadura,
para lo cual se cubrirá la pierna con un vendaje
fijo, ó tiras ligero.

5. Si hubiere necesidad de darle un purgante
mas eficaz, se preparará el siguiente:

Se mezclarán en 6 onzas, ó la 3^a parte de una
botella de agua del salitre.

8 drámes de sal de gomilatona.

1 - d - de Bicarbonato de Soda, y

30. gotas de Ácido sulfúrico.

Teniendo cuidado de poner primero la sal, luego
el bicarbonato de Soda, y por ultimo el ácido.

Si se quiere tener un purgante mas fuerte, se le agre-
garán 2 drámes mas de sal de gomilatona.

6 - A la hora de dormir se le darán 20 gotas
de laudano, con 20 gotas de éther; y solo se aumen-
tará la dosis del laudano, si las 20 gotas no pro-
ducen el efecto que se busca; no pasando este aumen-
to de 10 gotas. (Procurarse disminuir la dosis poco a poco)

7. Para el dolor al brazo izquierdo, se frotará con
el unguento mercurial. (Bueno pedirme un poco mas
de él a Bogotá).

